

1) Encontre o produto: $\left(1 - \frac{1}{4}\right)\left(1 - \frac{1}{9}\right)\left(1 - \frac{1}{16}\right)\dots\left(1 - \frac{1}{225}\right)$.

- (A) $\frac{10}{125}$ (B) $\frac{5}{9}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{8}{15}$ (E) $\frac{1}{120}$

2) Se dois lados de um triângulo medem 5 cm e 7 cm, então o terceiro lado não pode medir:


- (A) 11 cm (B) 10 cm (C) 6 cm (D) 3 cm (E) 1 cm

3) Quais os valores de x que satisfazem $\frac{1}{x-2} < 4$?


- (A) $x > \frac{3}{4}$ (B) $x > 2$ (C) $\frac{3}{4} < x < 2$ (D) $x < 2$ (E) todos os valores de x.

4) Quanto mede o ângulo α da figura?


- (A) 20° (B) 25° (C) 30° (D) 35° (E) 40°



5) Da figura, concluímos que $|z - x| + |w - x|$ é igual a :




- (A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14 (E) 15



6) Artur quer desenhar uma “espiral” de 4 metros de comprimento formada de segmentos de reta. Ele já traçou 7 segmentos, como mostra a figura. Quantos segmentos ainda faltam traçar?

- (A) 28 (B) 30 (C) 24 (D) 32 (E) 36

7) A figura mostra um retângulo e suas duas diagonais. Qual é a afirmativa correta a respeito dos ângulos x e y da figura?



- (A) $x < y$ (B) $x = y$ (C) $2x = 3y$ (D) $x = 2y$ (E) $x = 3y$

1. (D) Cada um dos fatores é da forma “diferença de quadrados” isto é $a^2 - b^2$, onde $a = 1$

$$\left(1 - \frac{1}{4}\right)\left(1 - \frac{1}{9}\right)\left(1 - \frac{1}{16}\right)\dots\left(1 - \frac{1}{225}\right) = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right)\left(1 - \frac{1}{4^2}\right)\dots\left(1 - \frac{1}{15^2}\right)$$

Usando a fatoração $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, obtemos:

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{1}{4}\right)\left(1 - \frac{1}{9}\right)\left(1 - \frac{1}{16}\right)\dots\left(1 - \frac{1}{225}\right) &= \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{4}\right)\left(1 + \frac{1}{4}\right)\dots\left(1 - \frac{1}{15}\right)\left(1 + \frac{1}{15}\right) = \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{4} \times \frac{4}{5} \times \dots \times \frac{15}{14} \times \frac{14}{15} \times \frac{16}{15} = \frac{1}{2} \times \frac{16}{15} = \frac{8}{15}. \end{aligned}$$

2. (E) Lembre que num triângulo a soma de dois lados quaisquer tem que ser maior que o terceiro lado. Como $1 + 5$ **não é maior** do que 7 , o terceiro lado não pode ser 1 .


3. (C) Temos: $\frac{1}{x-2} < 4 \Rightarrow \frac{1}{x-2} - 4 < 0 \Rightarrow \frac{1-4(x-2)}{x-2} < 0 \Rightarrow \frac{3-4x}{x-2} < 0$. Para que uma fração seja negativa, o numerador e o denominador têm que ter sinais trocados.

1º caso: $3 - 4x > 0$ e $x - 2 < 0$.

$3 - 4x > 0 \Rightarrow x < \frac{3}{4}$ e $x - 2 > 0 \Rightarrow x > 2$, o que é impossível.

2º caso: $3 - 4x < 0$ e $x - 2 > 0$.


$3 - 4x < 0 \Rightarrow x > \frac{3}{4}$ e $x - 2 < 0 \Rightarrow x < 2$. Logo, a resposta é $\frac{3}{4} < x < 2$.



4. (A) Os ângulos internos do quadrilátero na figura são: 50° , α , $180^\circ - 40^\circ$ e $180^\circ - 30^\circ$.

Como, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360° , temos:


$$50^\circ + \alpha + 140^\circ + 150^\circ = 360^\circ \Rightarrow \alpha = 20^\circ$$



5. (E) Temos: $\underbrace{|z-x|}_{\text{distância de } x \text{ a } z} = 3, 7 - (-1) = 4, 7$ e $\underbrace{|w-x|}_{\text{distância de } x \text{ a } w} = 9, 3 - (-1) = 10, 3$.

Logo, $|z-x| + |w-x| = 4, 7 + 10, 3 = 15$.

6. (D) A figura mostra que a “espiral” é formada de segmentos cujos comprimentos formam uma sequência finita da forma $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, \dots, n, n$ (se os dois últimos segmentos da espiral têm o mesmo comprimento) ou da forma $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, \dots, n, n, n+1$ (se os dois últimos segmentos da espiral têm comprimentos diferentes). Como o comprimento total é $4\text{ m} = 400\text{ cm}$, devemos ter:



$$\begin{cases} 1+1+2+2+3+3+\dots+n+n = 400 \Rightarrow 2 \times (1+2+3+\dots+n) = 400 \\ \text{ou} \\ 1+1+2+2+3+3+\dots+n+n+n+1 = 400 \Rightarrow 2 \times (1+2+3+\dots+n) + n+1 = 400 \end{cases}$$

A soma dos n primeiros números naturais é $1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$, logo temos:

$$\begin{cases} 2 \times \frac{n(n+1)}{2} = 400 \Rightarrow n(n+1) = 400 \\ \text{ou} \\ 2 \times \frac{n(n+1)}{2} + n+1 = 400 \Rightarrow n(n+1) + n+1 = 400 \Rightarrow (n+1)^2 = 400 \end{cases}$$


Não existem dois números naturais consecutivos cujo produto seja 400, logo, a equação $n(n+1) = 400$ não tem solução. De $(n+1)^2 = 400$ segue que $n+1 = 20$. Portanto, o último segmento da espiral tem 20 cm e o penúltimo 19 cm . Os comprimentos dos segmentos da espiral formam a sequência de números $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, \dots, 19, 19, 20$.

Portanto, são $19 \times 2 + 1 = 39$ segmentos. Como 7 já foram traçados, faltam 32.

7. (D) Seja O o ponto de interseção das duas diagonais do retângulo. Então $AO=BO$, portanto o triângulo AOB é isósceles e logo $\widehat{OAB}=\widehat{OBA}=y$.

Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° , no triângulo AOB temos:


$$2y + 180^\circ - x = 180^\circ \Rightarrow x = 2y.$$



1) Qual a menor das raízes da equação $2(x - 3\sqrt{5})(x - 5\sqrt{3}) = 0$?

2) Quantas soluções inteiras e positivas satisfazem a dupla inequação $2000 < \sqrt{n(n+1)} < 2005$?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5



3) Seja v a soma das áreas das regiões pertencentes unicamente aos três discos pequenos (em cinza claro), e seja w a área da região interior unicamente ao maior disco (em cinza escuro). Os diâmetros dos círculos são 6, 4, 4 e 2. Qual das igualdades abaixo é verdadeira?

- (A) $3v = \pi w$ (B) $3v = 2w$ (C) $v = w$
(D) $\pi v = 3w$ (E) $\pi v = w$


4) A menor raiz da equação $\frac{|x-1|}{x^2} = 6$ é:

- (A) $-\frac{1}{3}$ (B) $-\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{4}$ (E) $\frac{3}{2}$

5) Uma mesa quadrada tem 1 metro de lado. Qual o menor diâmetro de uma toalha redonda que cubra completamente o tambo da mesa?

- (A) 1 (B) 1,5 (C) 2 (D) $\sqrt{2}$ (E) $\sqrt{3}$

1. **Solução 1:** A equação já é dada na forma fatorada $a(x - m)(x - n) = 0$, logo as raízes são $m = 3\sqrt{5}$ e $n = 5\sqrt{3}$. Devemos decidir qual delas é a maior. Sabemos que $\sqrt{5} < 2,3$ e $1,7 < \sqrt{3}$, logo $3\sqrt{5} < 3 \times 2,3$ e $5 \times 1,7 < 5\sqrt{3} \Rightarrow 3\sqrt{5} < 6,9$ e $8,5 < 5\sqrt{3}$. Como 6,9 é menor do que 8,5, concluímos que $3\sqrt{5}$ é menor do que $5\sqrt{3}$.



Solução 2: Comparar $3\sqrt{5}$ e $5\sqrt{3}$ é o mesmo que comparar $(3\sqrt{5})^2$ e $(5\sqrt{3})^2$. Assim, $(3\sqrt{5})^2 = 9 \times 5 = 45 < 75 = 25 \times 3 = (5\sqrt{3})^2$. Logo, $3\sqrt{5}$ é menor do que $5\sqrt{3}$.

2. (E) Como os números que aparecem são todos positivos, podemos elevá-los ao quadrado mantendo os sinais, isto é: $2000^2 < n(n+1) < 2005^2$. Observe que n e $n+1$ são inteiros consecutivos. Logo, temos as seguintes opções:

$$2000^2 < 2000 \times 2001 < 2005^2$$

$$2000^2 < 2001 \times 2002 < 2005^2$$

$$2000^2 < 2002 \times 2003 < 2005^2$$

$$2000^2 < 2003 \times 2004 < 2005^2$$

$$2000^2 < 2004 \times 2005 < 2005^2$$

Logo, temos 5 possibilidades para n : 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

3. (C) Os raios dos três discos menores são 1,2 e 2; e do disco maior 3. Denotemos por b a área em branco, temos:

$$v = \underset{\substack{\text{área do disco} \\ \text{de raio 3}}}{9\pi} - b \quad \text{e}$$

$$w = 9\pi - b. \text{ Logo, } v=w.$$

**A área do
disco de
raio
 r é πr^2**

4. (B) 1º caso: $x \geq 1$

Nesse caso, $x - 1 \geq 0$, donde $|x - 1| = x - 1$. A equação toma a forma $\frac{x-1}{x^2} = 6$ ou $6x^2 - x + 1 = 0$. Essa equação não tem raízes reais porque $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 6 \times 1 = 1 - 24$ é negativo.


2º caso: $x < 1$

Nesse caso, $x - 1 < 0$, donde $|x - 1| = -(x - 1) = 1 - x$. A equação toma a forma $\frac{1-x}{x^2} = 6$ ou $6x^2 + x - 1 = 0$. Resolvendo essa equação temos:

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \times 6 \times (-1)}}{2 \times 6} = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{12} = \frac{-1 \pm 5}{12} \Rightarrow x = -\frac{1}{2} \text{ e } x = \frac{1}{3}.$$
 Como essas duas raízes são menores que 1, elas são as raízes da equação do enunciado. A menor delas é $x = -\frac{1}{2}$.

5. (D) Para que a toalha cubra inteiramente a mesa e que tenha o menor diâmetro possível, o quadrado deve estar inscrito no círculo. A diagonal do quadrado é o diâmetro do círculo, logo pelo Teorema de Pitágoras, temos:

$$d^2 = 1^2 + 1^2 \Rightarrow d = \sqrt{2}$$




1) Os valores positivos de x para os quais $(x - 1)(x - 2)(x - 3) < 0$ formam o conjunto:


- (1, 3) (2, 3)
(0, 3)
(0,1) \cup (2, 3)
(1, 2)

2) Num triângulo retângulo, definimos o cosseno de seus

ângulos agudos α por: $\cos \alpha = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{c}{a}$.




O triângulo retângulo da figura tem cateto $OA=1$. Escreva em ordem crescente os cossenos dos ângulos de 25° , 41° e 58°



3) Os ramais de uma central telefônica têm apenas 2 algarismos, de 00 a 99. Nem todos os ramais estão em uso. Trocando a ordem de dois algarismos de um ramal em uso, ou se obtém o mesmo número ou um número de um ramal que não está em uso. O maior número possível de ramais em uso é:

- (A) Menos que 45 (B) 45 (C) entre 45 e 55 (D) mais que 55 (E) 55


4) Um ônibus, um trem e um avião partem no mesmo horário da cidade A para a cidade B. Se eu tomar o ônibus cuja velocidade média é 100 km/h , chegarei à cidade B às 20 horas. Se eu tomar o trem, cuja velocidade média é 300 km/h , chegarei à cidade B às 14 horas. Qual será o horário de chegada do avião se sua velocidade média é de 900 km/h ?



5) Na figura O é o centro do círculo e $AB = 5 \text{ cm}$. Qual é o diâmetro desse círculo?

6) Iara possui R\$50,00 para comprar copos que custam R\$2,50 e pratos que custam R\$7,00. Ela quer comprar no mínimo 4 pratos e 6 copos. O que ela pode comprar ?


1. Para que um produto de três fatores seja negativo, devemos ter dois fatores positivos e um fator negativo, ou os três negativos.



As possibilidades são:


$$1) \underbrace{(x-1)}_{+} \underbrace{(x-2)}_{+} \underbrace{(x-3)}_{-} \Rightarrow x > 1, x > 2 \text{ e } x < 3.$$

Nesse caso, a solução é $2 < x < 3$.




$$2) \underbrace{(x-1)}_{+} \underbrace{(x-2)}_{-} \underbrace{(x-3)}_{+} \Rightarrow x > 1, x < 2 \text{ e } x > 3.$$

Nesse caso temos $1 < x < 2$ e $x > 3$, o que não é possível. Logo, esse caso não pode ocorrer.




$$3) \underbrace{(x-1)}_{-} \underbrace{(x-2)}_{+} \underbrace{(x-3)}_{+} \Rightarrow x < 1, x > 2 \text{ e } x > 3.$$

Nesse caso temos $x < 1$, $x > 2$ e $x > 3$, o que não é possível.



$$4) \underbrace{(x-1)}_{-} \underbrace{(x-2)}_{-} \underbrace{(x-3)}_{-} \Rightarrow x < 1, x < 2 \text{ e } x < 3.$$



Nesse caso, a solução é $x < 1$. Logo, a solução são todos os números reais x tais que $x < 1$ ou $2 < x < 3$; ou seja, a união de dois intervalos: $(0, 1) \cup (2, 3)$

2. De acordo com a definição de cosseno, temos: $\cos 25^\circ = \frac{1}{OM}$, $\cos 41^\circ = \frac{1}{ON}$ e $\cos 58^\circ = \frac{1}{OB}$.

Na figura, vemos que $OM < ON < OB$, logo $\cos 58^\circ < \cos 41^\circ < \cos 25^\circ$.

3. (E) Existem dois tipos de ramais:

- (i) os dois algarismos são iguais (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, e 99) , esses são em número de 10
- (ii) os dois algarismos são distintos, nesse caso temos $10 \times 9 = 90$ números, e metade deles podem ser usados.

Logo, temos no máximo $10 + 45 = 55$.

4. Seja d a distância entre as duas cidades e h o horário de partida comum do ônibus, do trem e do avião. Como, distância = velocidade \times tempo , temos:

$d = 100 \times (20 - h)$ e $d = 300 \times (14 - h)$. Logo, $100 \times (20 - h) = 300 \times (14 - h)$ donde $h = 11$. Portanto, a distância entre as duas cidades é $d = 100 \times (20 - 11) = 900 \text{ km}$. Logo, o avião gasta 1 hora da cidade A à cidade B, e portanto ele chega às 12 horas.

5. Observe que OC é um raio do círculo. Temos que $OC = AB = 5 \text{ cm}$ por serem as diagonais do retângulo OACB. Logo, o diâmetro é 10 cm .

6. Sejam c e p o número de copos e pratos que Iara pode comprar. Logo seu gasto é $2,5c + 7p$. Ela só tem R\$ 50,00, logo $2,5c + 7p \leq 50$ (I) Além disso, ela quer comprar no mínimo 4 pratos e 6 copos, logo $p \geq 4$ e $c \geq 6$ (II). Devemos encontrar dois números inteiros c e p (número de copos e pratos são números inteiros) que satisfaçam (I) e (II).


Se ela comprar 4 pratos sobram $50 - 4 \times 7 = 22$ reais para os copos. Como $22 = 8 \times 2,50 + 2$, ela pode comprar 8 copos (sobrando-lhe R\$ 2,00).

Se ela comprar 5 pratos sobram $50 - 5 \times 7 = 15$ reais para os copos. Como $15 = 6 \times 2,50$, ela pode comprar 6 copos.

Se ela comprar 6 pratos sobram $50 - 6 \times 7 = 8$ reais para os copos, o que lhe permite comprar apenas 1 copo que não é o que ela quer.

Logo, Iara pode comprar 4 pratos e 8 copos, ou 5 pratos e 6 copos.

1) Para fabricar 9 discos de papelão circulares para o Carnaval usam-se folhas quadradas de 10 cm de lado como indicado na figura. Qual a área do papel não aproveitado?



- (A) 25 cm^2
 (B) $22,5 \text{ cm}^2$
 (C) $21,5 \text{ cm}^2$
 (D) 21 cm^2
 (E) 22 cm^2


2) Determine quais afirmações são verdadeiras:

- (A) $|-108| > 100$ (B) $|5 - 13| = |5| - |13|$ (C) $|2 - 9| = 9 - 2$
 (D) $|a^2 + 5| = a^2 + 5$ (E) $|-6a| = 6|a|$

3) Se $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}} = 5$ então $\frac{x+y}{2y}$ é igual a:


- (A) $5/2$ (B) $3\sqrt{2}$ (C) $13y$ (D) $25y/2$ (E) 13

4) A figura mostra um retângulo KGST e um triângulo KGR. Os ângulos KRT e RGS são iguais. Se $TR=6$ e $RS=2$ qual é a área de KGR?



- (A) 12 (B) 16 (C) $8\sqrt{2}$ (D) $8\sqrt{3}$ (E) 14

5) **Sinal de um produto e sinal de um quociente:** a, b, c e d são quatro números não nulos tais que os quocientes $\frac{a}{5}$, $\frac{-b}{7a}$, $\frac{11}{abc}$, $\frac{-18}{abcd}$ são positivos. Determine os sinais de a, b, c e d .



6) No triângulo KLM temos $KL=KM$, $KT=KS$ e $\angle LKS=30^\circ$. Qual a medida do ângulo TSM?

- (A) 10°
 (B) 15°
 (C) 20°
 (D) 25°
 (E) 30°

1. Lembre que a área de um círculo é πr^2 , onde r é o raio do círculo. Se r é o raio dos círculos da figura, então a área pedida é:

$$\underbrace{\text{área do quadrado}}_{10 \times 10 = 100} - \underbrace{\text{área dos 9 círculos}}_{9 \times \pi r^2} = 100 - 9 \times \pi \times \left(\frac{5}{3}\right)^2 = 100 - 25\pi$$

Usando a aproximação $\pi \approx 3,14$, obtemos $100 - 25\pi \approx 100 - 25 \times 3,14 = 21,5 \text{ cm}^2$.

A área do círculo de raio r é πr^2

2. (A) $|-108| = 108 > 100$, verdadeira

(B) $|5 - 13| = |-8| = 8$ e $|5| - |13| = 1 - 13 = -8$, falsa.

(C) $|2 - 9| = -(2 - 9) = 9 - 2$ porque $2 - 9 < 0$, verdadeira.

(D) $|a^2 + 5| = a^2 + 5$ porque $a^2 + 5 > 0$ para qualquer valor de a , verdadeira.

(E) $|-6a| = |-6| \times |a| = 6|a|$, verdadeira.

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

3.(E) Elevando ao quadrado ambos os membros de $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}} = 5$, obtemos $\frac{x}{y} = 25$. Agora,

$$\frac{x+y}{2y} = \frac{1}{2} \times \frac{x+y}{y} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{y}\right) = \frac{1}{2} \times \left(\frac{x}{y} + 1\right) = \frac{1}{2} \times (25 + 1) = 13.$$

4.(D) Os triângulos TKR e GRS são proporcionais por serem triângulos retângulos com um ângulo agudo igual. Logo, temos: $\frac{RS}{TK} = \frac{GS}{TR}$. Como $GS = TK$ segue que

$$TK^2 = RS \times TR = 2 \times 6 = 12 \Rightarrow TK = 2\sqrt{3}. \text{ A área do triângulo KGR vale}$$

$$\frac{\overbrace{KG}^{\text{base}} \times \overbrace{TK}^{\text{altura}}}{2} = \frac{(TR + RS) \times 2\sqrt{3}}{2} = \frac{8 \times 2\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}$$

5. Solução:


- $\frac{a}{5} > 0 \Rightarrow a > 0$

- Temos $a > 0 \Rightarrow 7a > 0$, logo: $\frac{-b}{7a} > 0 \Rightarrow -b > 0 \therefore b < 0$

- $\frac{11}{abc} > 0 \Rightarrow abc > 0$. Como $a > 0$ e $b < 0$ segue que $c < 0$ ($\begin{matrix} a & b & c \\ + & - & - \end{matrix} > 0$)

- $\frac{-18}{abcd} > 0 \Rightarrow abcd < 0$, como $abc > 0$ segue que $d < 0$.

6. (B) Sejam $\widehat{TSM} = x, \widehat{SKT} = y, \widehat{KLS} = \alpha, \widehat{KTS} = \beta$. O triângulo KLM é isósceles porque tem dois lados iguais; conseqüentemente seus ângulos da base são iguais, isto é: $\widehat{KLS} = \widehat{KMS} = \alpha$. Analogamente, o triângulo KST também é isósceles e portanto $\widehat{KST} = \widehat{KTS} = \beta$. Usaremos agora que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° . Acompanhe na figura:



- No triângulo STM temos: $x + \alpha + 180^\circ - \beta = 180^\circ \Rightarrow x = \beta - \alpha$
- No triângulo KLM temos: $\alpha + \alpha + 30^\circ + y = 180^\circ \Rightarrow y = 150^\circ - 2\alpha$.

Logo,

$$\beta + \beta + 150^\circ - 2\alpha = 180^\circ \Rightarrow \beta - \alpha = 15^\circ. \text{ Portanto, } x = 15^\circ.$$

1) Quantos são os pares diferentes de inteiros positivos (a, b) tais que $a + b \leq 100$ e

$$\frac{a + \frac{1}{b}}{\frac{1}{a} + b} = 13?$$


- (A)1 (B)5 (C)7 (D)9 (E)13

2) Se $x + |x| + y = 5$ e $x + |y| - y = 6$ então $x + y$ é:

- (A)-1 (B)11 (C)9/5 (D) 1 (E)-11

3) Na figura, os três círculos são concêntricos, e as áreas do menor círculo e do maior anel (em cinza) são iguais. O raio do menor círculo é 5 cm e do maior 13 cm . Qual o raio do círculo intermediário?

- (A)12
(B)11
(C) $10\sqrt{65}$
(D) $5\sqrt{3}$
(E) $12\sqrt{2}$



4) Encontre os algarismos que estão faltando sobre cada um dos traços:

$$(a) \frac{126}{8_} = \frac{21}{_} \quad ; \quad (b) \frac{_8}{33_} = \frac{4}{5}$$

5) **Uma a mais!** Na lista de frações, no quadro ao lado, temos:

- 2 frações cuja soma é $\frac{5}{2}$
- 2 frações cuja diferença é $\frac{5}{2}$
- 2 frações cujo produto é $\frac{5}{2}$
- 2 frações cujo quociente é $\frac{5}{2}$




$\frac{5}{4}$	$\frac{17}{6}$	$\frac{-5}{4}$	$\frac{10}{7}$	$\frac{2}{3}$
$\frac{14}{8}$	$\frac{-1}{3}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{-3}{2}$	

Encontre a fração que está sobrando.

6) *O café, o bolo e o gato* – Dez minutos antes de colocar o bolo no forno, eu coloquei meu gato do lado de fora da casa. O bolo deve cozinhar por 35 minutos, então eu coloquei o despertador para tocar 35 minutos, após colocar o bolo no forno. Imediatamente fiz um café para mim, o que me tomou 6 minutos. Três minutos antes de acabar de beber o café o gato entrou em casa. Isso foi 5 minutos antes do despertador tocar. O telefone tocou no meio do tempo entre eu acabar de fazer o café e o gato entrar em casa. Falei ao telefone por 5 minutos e desliguei. Eram 3h59min da tarde.

- (a) A que horas coloquei o gato fora de casa?
 (b) Quantos minutos depois de colocar o gato fora de casa, o despertador tocou?
 Quanto tempo o gato estava fora de casa até o momento em que o telefone tocou?

7) Quais figuras estão corretas?



1. (C) Temos: $13 = \frac{a + \frac{1}{b}}{\frac{1}{a} + b} = \frac{ab + 1}{1 + ab} = \frac{a}{b}$. Logo, $a = 13b$ e como $a + b \leq 100$ segue que $14b \leq 100 \Rightarrow b \leq 7,14$. Como b é inteiro devemos ter $b \leq 7$. Logo os pares são em número de 7, a saber:
(13, 1), (26, 2), (39, 3), (52, 4), (65, 5), (78, 6), (91, 7)

2. (C) Se $x < 0$, então $|x| = -x$ e da 1ª equação temos $x + (-x) + y = 5 \Rightarrow y = 5$. Substituindo esse valor na 2ª equação obtemos $x = 6$ o que não é possível pois estamos supondo $x < 0$. Logo, não há solução para $x < 0$.

Se $y \geq 0$, então $|y| = y$ e da 2ª equação segue que $x = 6$. Substituindo esse valor na 1ª equação encontramos $y = -7$, o que não é possível porque estamos supondo que y é positivo.

Concluimos que não há solução para $y \geq 0$ e $x < 0$. Logo, $y < 0$ e $x \geq 0$, e as equações são:
 $2x + y = 5$ e $x - 2y = 6$. Resolvendo obtemos $x = \frac{16}{5}$ e $y = -\frac{7}{5}$. Portanto, $x + y = \frac{9}{5}$.

3. (A) A área do menor círculo é $5^2 \pi = 25\pi \text{ cm}^2$ e do maior é $13^2 \pi = 169\pi \text{ cm}^2$. Seja r o raio do círculo intermediário, então a área do maior anel é $169\pi - \pi r^2$. Logo, $169\pi - \pi r^2 = 25\pi \Rightarrow r^2 = 169 - 25 = 144$, donde $r = 12 \text{ cm}$

4.(a) Observe que $126 \div 6 = 21$, logo, o numerador 126 foi dividido por 6 para obter o numerador 21 da outra fração. Logo, o denominador 84 também é divisível por 6. O único número da forma 84 que é divisível por 6 é 84, e $84 \div 6 = 18$. Podemos então completar as frações:

$$\frac{126}{84} \xrightarrow{\div 6} \frac{21}{18}$$

(b) Note que 33_ deve ser múltiplo de 5, logo só pode ser 330 ou 335. Temos

Como $\frac{4}{5} = 0,8$, segue que $\frac{8}{330} = 0,8$ ou $\frac{8}{335} = 0,8$. Temos

$330 \times 0,8 = 264$ e $335 \times 0,8 = 268$, segue que $8 = 268$ e $33_ = 335$. Podemos completar as

frações: $\frac{268}{335} = \frac{4}{5}$. Note que $\frac{268}{335} = \frac{268 \div 67}{335 \div 67} = \frac{4}{5}$.

5. (a) 2 frações cujo produto é $\frac{5}{2} : \frac{10}{7} \times \frac{14}{8} = \frac{10}{7} \times \frac{7}{4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$

$\frac{\cancel{5}}{\cancel{4}}$	$\frac{17}{6}$	$\frac{\cancel{5}}{\cancel{4}}$	$\frac{10}{7}$	$\frac{2}{3}$
$\frac{14}{8}$	$\frac{-1}{3}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{-3}{2}$	

(b) 2 frações cuja diferença é $\frac{5}{2} : \frac{5}{4} - \left(-\frac{5}{4}\right) = \frac{5}{4} + \frac{5}{4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$

$\frac{\cancel{5}}{\cancel{4}}$	$\frac{17}{6}$	$\frac{\cancel{5}}{\cancel{4}}$	$\frac{\cancel{10}}{\cancel{7}}$	$\frac{2}{3}$
$\frac{\cancel{14}}{\cancel{8}}$	$\frac{-1}{3}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{-3}{2}$	

(c) 2 frações cuja soma é $\frac{5}{2} : \frac{17}{6} + \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{17}{6} - \frac{1}{3} = \frac{17}{6} - \frac{2}{6} = \frac{15}{6} = \frac{5}{2}$

$\frac{\cancel{5}}{\cancel{4}}$	$\frac{\cancel{17}}{\cancel{6}}$	$\frac{\cancel{5}}{\cancel{4}}$	$\frac{\cancel{10}}{\cancel{7}}$	$\frac{2}{3}$
$\frac{\cancel{14}}{\cancel{8}}$	$\frac{\cancel{-1}}{\cancel{3}}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{-3}{2}$	

(d) 2 frações cujo quociente é $\frac{5}{2} : \frac{5}{3} \div \frac{2}{3} = \frac{5}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$.

$\frac{\cancel{5}}{\cancel{4}}$	$\frac{\cancel{17}}{\cancel{6}}$	$\frac{\cancel{5}}{\cancel{4}}$	$\frac{\cancel{10}}{\cancel{7}}$	$\frac{\cancel{2}}{\cancel{3}}$
$\frac{\cancel{14}}{\cancel{8}}$	$\frac{\cancel{-1}}{\cancel{3}}$	$\frac{\cancel{5}}{\cancel{3}}$	$\frac{-3}{2}$	

Logo, a fração que está sobrando é $-3/2$.

6. Vamos listar os eventos ocorridos e contar o tempo gasto em cada um. A primeira atividade foi colocar o gato fora da casa, logo nossa lista começa com essa atividade e o tempo é contado a partir dela.

Atividade	Tempo depois que o gato foi posto fora de casa
Gato fora de casa	0 minutos
Bolo no forno	10 minutos
Fazer o café	10+6=16 minutos
Despertador toca	35+10=45 minutos
Gato entra em casa	45-5=40 minutos
Acabar de tomar o café	40+3=43 minutos
Telefone toca	16+(40-16):2=28 minutos
Desligar o telefone	28+5 =33 minutos

Podemos agora dar as respostas.

- (a) Às 3:59 horas desliguei o telefone, o que ocorreu 33 minutos depois de colocar o gato fora de casa. Logo a resposta é $3:59-0:33=3:26$.
- (b) O despertador toca 45 minutos após colocar o gato fora de casa.
- (c) 28 minutos

Podemos saber exatamente a hora de cada atividade; veja na tabela a seguir.

Atividade	Tempo depois que o gato foi posto fora de casa	Hora atual
Gato fora de casa	0 minutos	$3:59 - 0:33 = 3:26$
Bolo no forno	10 minutos	$3:26 + 0:10 = 3:36$
Fazer o café	$10 + 6 = 16$ minutos	$3:26 + 0:16 = 3:42$
Despertador toca	$35 + 10 = 45$ minutos	$3:26 + 0:45 = 4:11$
Gato entra em casa	$45 - 5 = 40$ minutos	$3:26 + 0:40 = 4:06$
Acabar de tomar o café	$40 + 3 = 43$ minutos	$3:26 + 0:43 = 4:09$
Telefone toca	$16 + (40 - 16) : 2 = 28$ minutos	$3:26 + 0:28 = 3:54$
Desligar o telefone	$28 + 5 = 33$ minutos	3:59

7. Figura 1: Não está correta porque a soma dos ângulos internos não dá 180°

Figura 2: Não está correta porque o comprimento dos lados não satisfaz o Teorema de Pitágoras, logo o triângulo não pode ser retângulo

Figura 3: Não está correta porque um dos lados não é menor que a soma dos outros dois: $15 > 6 + 8$

1) Resolva a equação $\frac{|x-1|}{x^2} = 6$.

2) Se um arco de 60° num círculo I tem o mesmo comprimento que um arco de 45° num círculo II, então a razão entre a área do círculo I com a do círculo II é:

- (A) 16/9 (B) 9/16 (C) 4/3 (D) 3/4 (E) 6/9

3) Se $x > 0$, $y > 0$, $x > y$ e $z \neq 0$, então a única opção errada é:

- (A) $x + z > y + z$ (B) $x - z > y - z$ (C) $xz > yz$
(D) $\frac{x}{z^2} > \frac{y}{z^2}$ (E) $xz^2 > yz^2$

4) Resolva geometricamente as equações:


- (a) $|x - 5| = 2$ (b) $|x + 3| = 1$
(c) $|3x - 7| = 9$ (d) $|x + 2| = |x - 5|$

5) A pista de um autódromo tem 20 km de comprimento e forma circular. Os pontos marcados na pista são: A, que é o ponto de partida, B que dista 5 km de A no sentido do percurso, C que dista 3 km de B no sentido do percurso, D que dista 4 km de C no sentido do percurso e E que dista 5 km de D no sentido do percurso. Um carro que parte de A e pára após percorrer 367 km estará mais próxima de qual dos 5 pontos?

- (A) A (B) B (C) C (D) D (E) E

6) No diagrama ao lado, todos os quadradinhos têm 1 cm de lado. Qual é o maior comprimento?

- (A) AE
(B) $CD + CF$
(C) $AC + CF$
(D) FD
(E) $AC + CE$



7) Quantos dentre os números $-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ satisfazem a desigualdade $-3x^2 < -14$?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

1. 1º caso: $x \geq 1$

Nesse caso $x - 1 \geq 0$, donde $|x - 1| = x - 1$. A equação toma a forma $\frac{x-1}{x^2} = 6$ ou $6x^2 - x + 1 = 0$. Esta equação não tem raízes reais porque $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 6 \times 1 = 1 - 24$ é negativo. Logo, não temos soluções maiores ou iguais a 1.

2º caso: $x < 1$

Nesse caso $x - 1 < 0$, donde $|x - 1| = -(x - 1) = 1 - x$. A equação toma a forma

$\frac{1-x}{x^2} = 6$ ou $6x^2 + x - 1 = 0$. Resolvendo esta equação temos:

$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \times 6 \times (-1)}}{2 \times 6} = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{12} = \frac{-1 \pm 5}{12} \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$ e $x = \frac{1}{3}$. Como essas duas raízes são menores que 1, elas são as raízes da equação do enunciado.


2. (B) Como o arco de 60° do círculo I tem o mesmo comprimento que o arco de 45° no círculo II, concluímos que o raio do círculo I é menor que o do círculo II. Denotemos por r e R os raios dos círculos I e II respectivamente.

No círculo I o comprimento do arco de 60° , é igual a $1/6$ de seu comprimento, ou seja $\frac{2\pi r}{6} = \frac{\pi r}{3}$.

Analogamente, no círculo II o comprimento do arco de 45° , é igual a $1/8$ de seu comprimento, ou seja $\frac{2\pi R}{8} = \frac{\pi R}{4}$.

Logo, $\frac{\pi r}{3} = \frac{\pi R}{4} \Rightarrow \frac{r}{R} = \frac{3}{4}$. Finalmente temos:

$$\frac{\text{área do círculo I}}{\text{área do círculo II}} = \frac{\pi r^2}{\pi R^2} = \left(\frac{r}{R}\right)^2 = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$$



3. Nessa questão usaremos as propriedades das desigualdades.

Podemos somar o mesmo número a ambos os membros de uma desigualdade sem alterar o

sinal, temos: $x > y \Rightarrow \begin{cases} x + z > y + z \text{ (somando } z \text{ a ambos os membros)} \\ x - z > y - z \text{ (somando } -z \text{ a ambos os membros)} \end{cases} \Rightarrow \text{(A) e (B) corretas}$

A opção (C) é falsa porque z pode ser negativo, por exemplo: $x=5, y=3$ e $z=-2$ temos:

$$5 > 3, \text{ no entanto } \underbrace{5 \times (-2)}_{xz} = -10 < -6 = \underbrace{3 \times (-2)}_{yz}.$$

Como $z \neq 0$ então $z^2 > 0$ e $\frac{1}{z^2} > 0$, logo as opções (D) e (E) estão corretas porque foram obtidas multiplicando-se ambos os membros de $x > y$ por um número positivo; em (E) por z^2 e em (D) por $\frac{1}{z^2}$.


4. Solução:

Interpretação geométrica de módulo:

$|a - b| = \text{distância entre } a \text{ e } b$


(a) $|x - 5| = 2 \Leftrightarrow$ números cuja distância ao 5 é 2.

Logo as raízes são 3 e 7.



(b) $|x + 3| = 1 \Leftrightarrow$ números cuja distância ao -3 é 1.

Logo as raízes são -4 e -2.




(c) Fazendo a mudança de variável $y = 3x$, a equação toma a forma $|y - 7| = 9 \Leftrightarrow$ números cuja distância ao 7 é 9.

Logo as raízes são $y = -2$ e $y = 16$.

Destrocando a variável temos


$3x = -2$ e $3x = 16$, e obtemos as

raízes da equação: $x = -\frac{2}{3}$ e $x = \frac{16}{3}$.




(d) As raízes da equação $|x + 2| = |x - 5|$ são os números equidistantes de -2 e de 5. Esses números só podem estar entre -2 e 5.

Logo, a solução é $x = 1,5$



5. (C) Vamos marcar os 4 pontos a partir de A.

Como o comprimento é de 20 km , o comprimento de cada um dos 4 quadrantes é 5 km . Podemos então marcar os pontos. Como $367 = 18 \times 20 + 7$, o carro deu 18 voltas completas e percorreu mais 7 km a partir de A. Logo, ele passa 2 km após B, o que significa que ele pára 1 km de C. Portanto, C é o ponto mais próximo.



6. Note que :

- AE é a hipotenusa de um triângulo de catetos 5 cm e 9 cm
- CF é a hipotenusa de um triângulo de catetos 2 cm e 3 cm
- AC é a hipotenusa de um triângulo de catetos 3 cm e 3 cm
- FD é a hipotenusa de um triângulo de catetos 2 cm e 9 cm
- CE é a hipotenusa de um triângulo de catetos 2 cm e 6 cm

Usando o Teorema de Pitágoras calculamos essas hipotenusas:

$$AE = \sqrt{5^2 + 9^2} = \sqrt{106} \approx 10,3$$

$$CF = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} \approx 3,6 \Rightarrow CD + CF \approx 5 + 3,6 = 8,6$$

$$AC = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} \approx 4,2 \Rightarrow AC + CF \approx 4,2 + 3,6 = 7,8$$

$$FD = \sqrt{2^2 + 9^2} = \sqrt{85} \approx 9,22$$

$$CE = \sqrt{2^2 + 6^2} = \sqrt{40} \approx 6,3 \Rightarrow AC + CE \approx 4,2 + 6,3 = 10,5$$

Logo, o maior é $AC+CE$


7. (D) Se $-3x^2 < -14$ então $3x^2 > 14$ ou $x^2 > \frac{14}{3} = 4\frac{2}{3}$. Como estamos olhando apenas para valores inteiros de x , então x^2 também é inteiro. Sendo $x^2 > 4\frac{2}{3}$, concluímos que x^2 é no mínimo 5. Os números acima que satisfazem essa condição são $-5, -4, -3$ e 3 . Logo a resposta é 4.

1. (N2/N3) Partindo do número 265863 e utilizando uma única vez cada uma das operações + ; - ; × ; ÷, e também uma única vez os números 51, 221, 6817, 13259, podemos obter vários números, por exemplo 54911:

$$265863 \xrightarrow{\div 221} 1203 \xrightarrow{\times 51} 61353 \xrightarrow{-13259} 48094 \xrightarrow{+6817} 54911$$

Encontre a cadeia que permite obter o menor número inteiro positivo.

2. (N2/N3) Você sabe repartir a figura ao lado em duas partes idênticas (que possam ser superpostas)? $AB=AE=ED=CD=CA$



3. (N1/N2/N3) *Cada um em seu Estado* - Amélia, Bruno, Constância e Denise são 4 amigos que moram em Estados diferentes e se encontram sentados numa mesa quadrada, cada um ocupa um lado da mesa.

- À direita de Amélia está quem mora no Amazonas;
- Em frente à Constância está a pessoa que mora em São Paulo;
- Bruno e Denise estão um ao lado do outro;
- Uma mulher está à esquerda da pessoa que mora no Ceará.
- Um dos quatro mora na Bahia. Quem?

4. (N1/N2) *Divisão* - Numa divisão, aumentando o dividendo de 1989 e o divisor de 13, o quociente e o resto não se alteram. Qual é o quociente?


$$\begin{array}{r} \boxed{} \\ \hline \boxed{} \\ \hline \end{array}$$

!!!!!!


5. (N1/N2) *Extra-terrestre* - No planeta Staurus, os anos têm 228 dias (12 meses de 19 dias). Cada semana tem 8 dias: Zerum, Uni, Duodi, Trio, Quati, Quio, Seise e Sadi. Sybock nasceu num duodi que foi o primeiro dia do quarto mês. Que dia da semana ele festejará seu primeiro aniversário?

6. (N1/N2) *Que família!* Numa família cada menino tem o mesmo número de irmãos que de irmãs, e cada menina tem o dobro de irmãos que de irmãs. Qual é a composição dessa família?


7. (N1) *Siga a pista* - Na pista de corrida ao lado, os 7 pontos de referência são marcados a cada 50 m. Os atletas devem fazer 2 km no sentido indicado pela flexa. Eles partem do ponto P. Marque o ponto de chegada C.



8. *Cara ou Coroa* - Jerônimo joga no tabuleiro ao lado da seguinte maneira: Ele coloca uma peça na casa "PARTIDA" e ele move a peça da seguinte maneira: ele lança uma moeda, se der CARA ele avança duas casas, e se der COROA ele recua uma casa. Jerônimo lançou a moeda 20 vezes e conseguiu chegar na casa CHEGADA. Quantas vezes a moeda deu CARA?



9. (N1) *Os relógios* - Um só dos quatro relógios indica a hora correta. Um está 20 minutos adiantado, outro está 20 minutos atrasado, e o quarto está parado. Qual é a hora certa?



10. (N1) *Contas do papagaio* - Rosa tem um papagaio que faz contas de um modo estranho. Cada vez que Rosa diz dois números ele faz a mesma conta, veja:

- Se Rosa diz "4 e 2" o papagaio responde "9"
- Se Rosa diz "5 e 3" o papagaio responde "12"
- Se Rosa diz "3 e 5" o papagaio responde "14"
- Se Rosa diz "9 e 7" o papagaio responde "24"
- Se Rosa diz "0 e 0" o papagaio responde "1"

Se Rosa diz "1 e 8" o que responde o papagaio?

11. (N1/N2) *As férias de Tomás* - Durante suas férias, Tomás teve 11 dias com chuva. Durante esses 11 dias, se chovia pela manhã havia sol sem chuva à tarde, e se chovia à tarde, havia sol sem chuva pela manhã. No total, Tomás teve 9 manhãs e 12 tardes sem chuva. Quantos dias duraram as férias de Tomás?

12. (N3) *Maratona de Matemática* - Numa Maratona de Matemática, o número de questões é muito grande. O valor de cada questão é igual à sua posição na prova: 1 ponto para a questão 1, 2 pontos para a questão 2, 3 pontos para a questão 3, 4 pontos para a questão 4, ..., 10 pontos para a questão 10, ... e assim por diante. Joana totalizou 1991 pontos na prova, errando apenas uma questão e acertando todas as outras. Qual questão ela errou? Quantas questões tinha a prova?

13. (N1) - Escolhi quatro frações entre $1/2, 1/4, 1/6, 1/10$ e $1/12$ cuja soma é 1. Quais foram as frações que eu não escolhi?


14. Um jogo- Regras;

- (i) Partindo da casa em cinza com o número 3 deve-se chegar à casa TOTAL deslocando-se somente por linhas ou colunas e calculando os pontos.
- (ii) Quando nos deslocamos por uma linha só podemos adicionar, por exemplo passando da 3 para a -6 ao lado, obtemos $3+(-6)=-3$ pontos
- (iii) Quando nos deslocamos por uma coluna só podemos subtrair, por exemplo passando da 3 para a 5 abaixo, obtemos $3-5=-2$ pontos.
- (iv) Só é permitido passar uma vez por cada casa.

Qual o caminho que dá o maior total?

3	-6	9	-9
5	7	2	-1
-8	-3	-5	4
-4	1	6	8
0	-2	-7	TOTAL

15. (N1/N2/N3) *Produtos em linha* - Em cada uma das casas em branco do quadro abaixo escrevemos um algarismo dentre oito algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 de modo que os produtos efetuados em linha reta seguindo as flexas forneçam os valores indicados dentro das casas em cinza. Em qual casa se encontra o número 2?




16. (N2/N3) *Código Postal* - Para fazer a separação em regiões da correspondência que deve ser entregue, um serviço postal indica sobre os envelopes um código postal com uma série de 5 grupos de bastões, que podem ser lidos por um leitor ótico. Os algarismos são codificados como a seguir:

0	••	5	• •
1	• •	6	• •
2	• •	7	••
3	• •	8	• •
4	••	9	••

A leitura se faz da direita para a esquerda, por exemplo o código postal 91720 se escreve como $\underbrace{\bullet\bullet\bullet\bullet}_{0} \underbrace{\bullet|\bullet|}_{2} \underbrace{||\bullet\bullet}_{7} \underbrace{\bullet|\bullet|}_{1} \underbrace{||\bullet\bullet}_{9}$. Em detalhe:

Note que a codificação de 94, $\underbrace{|•|}_{4} \underbrace{||\bullet\bullet}_{9}$, tem um eixo vertical de simetria. Encontre os códigos de 47000 a 47999, aqueles que apresentam um eixo vertical de simetria.

17. (N1/N2/N3) *Anéis olímpicos* – Os números de 1 a 9 foram colocados dentro de cinco anéis olímpicos de tal modo que dentro de cada anel a soma é 11.



Disponha os 9 números de outra maneira para que a soma dentro de cada anel seja a maior possível.


18. (N2/N3) Denise e Antônio jogam uma série de 8 jogos no qual o vencedor da primeira partida ganha 1 ponto, o da segunda 2 pontos, o da terceira 4 pontos, o da quarta 8 pontos e assim por diante, multiplicando por 2 o número de pontos de uma partida para a outra. No final, Denise ganhou 31 pontos a mais que Antônio e não houve empate em nenhuma das partidas. Quais partidas Denise ganhou?

19. (N1/N2) Você sabe repartir um quadrado em 7 quadrados menores?

20. (N1/N2/N3) *Ilha misteriosa* - Numa misteriosa ilha havia 13 camaleões cinza, 15 camaleões marrons e 17 camaleões vermelhos. Quando dois camaleões de cores diferentes se encontram, os dois tomam a terceira cor. Por exemplo, se um cinza se encontra com um vermelho, então os dois ficam marrons. Por causa de uma tempestade, ocorreram 2 encontros cinza-vermelho, 3 encontros marrom-vermelho e 1 encontro cinza-vermelho, quantos camaleões de cada cor ficaram na ilha?

21. (N3) *Universo hostil* - Num deserto há cobras, ratos e escorpiões. Cada manhã, cada cobra mata um rato. Cada meio-dia, cada escorpião mata uma cobra. Cada noite, cada rato mata um escorpião. Ao final de uma semana, à noite, só restava um rato. Quantos ratos havia na manhã no início da semana?

1. $265863 \xrightarrow{\div 6817} 39 \xrightarrow{+ 221} 260 \xrightarrow{\times 51} 13260 \xrightarrow{-13259} 1$




3. Bruno ou Amélia (O desafio tem duas soluções).

4. 153

5. Seise

6. 3 meninas e 4 meninos




8. 12

9. 17 h 05 min

10. 1


11. 16 dias

12. 25 e 63, respectivamente.




15. casa B

16. 47679 e 47779



18. 1^a , 2^a , 3^a , 4^a e 8^a



20. 16 cinzas, 18 marrons e 11 vermelhos

21. 1873

