



**Revista Escolar de la Olimpiada Iberoamericana de Matemática**  
**Número 27 (Septiembre - Octubre 2006)**  
**ISSN – 1698-277X**

## Índice

### Artículos, Notas y Lecciones de preparación Olímpica

**Francisco J. García Capitán:** Inversión en Olimpiadas (Aplicación de la inversión a la resolución de problemas)

.

### Problemas de Nivel medio y de Olimpiadas

Problemas propuestos en la Olimpiada Zhautykov, Alma Ata, Kirguistán, enero 2006.

### Resueltos:

Soluciones a los problemas 26-2 y 26-3 de este nivel, por Bruno Salgueiro Fanego, Vivero, España.

### Problemas para los más jóvenes

Cinco problemas rumanos

### Problemas resueltos

**Problema 116bis:** Recibidas soluciones de Samuel Gómez Moreno (Jaén, España); Luis Gómez Sánchez Alfaro (El Callao, Perú); Daniel Lasasa Medarde (Pamplona, España); Glauber Moreno Barbosa (Río de Janeiro, Brasil); Cristóbal Sánchez Rubio (Benicassim, España); y los proponentes.

Presentamos las soluciones de Samuel Gómez Moreno, Luis Gómez Sánchez Alfaro y Cristóbal Sánchez Rubio.

Comentario del editor: parece que, en este caso, un problema inicialmente planteado erróneamente ha dado origen a varias soluciones interesantes. Por eso presentamos tres.

**Problema 125.** Recibidas soluciones de José Luis Díaz Barrero (Barcelona, España); Daniel Lasasa Medarde (Pamplona, España); Marcos Martinelli (Brasil); Glauber Moreno Barbosa (Río de Janeiro, Brasil); Miquel Roig (Barcelona, España); Bruno Salgueiro Fanego (Vivero, España); Cristóbal Sánchez Rubio (Benicassim, España) y el proponente. Presentamos la solución de Miquel Roig.

**Problema 126.** Recibidas soluciones de Oscar Ferreira Alfaro (Valencia, España); Ovidio Furdui (Kalamazoo, USA); Daniel Lasasa Medarde (Pamplona, España); José Hernández Santiago (Oaxaca, México); Marcos Martinelli (Brasil); Miquel Roig (Barcelona, España); Bruno Salgueiro Fanego (Vivero, España); Vicente Vicario García (Huelva, España) y el proponente. Se

recibió una solución incorrecta. Presentamos la solución de Hernández Santiago.

**Problema 127.** Recibidas soluciones de José Carlos García Barro (Mondoñedo, España); Marcos Martinelli (Brasil); Daniel Lasasa Medarde (Pamplona, España); Gabriel Alexander Reyes (San Salvador, El Salvador); Miquel Roig (Barcelona, España); Bruno Salgueiro Fanego (Vivero, España); Vicente Vicario García (Huelva, España), y el proponente. Presentamos la solución de Gabriel Alexander Reyes.

**Problema 128.** Recibidas soluciones de Marcos Martinelli (Brasil); Cristóbal Sánchez Rubio (Benicassim, España), Daniel Lasasa Medarde (Pamplona, España); Bruno Salgueiro Fanego (Vivero, España) y el proponente. Presentamos la solución de Sánchez Rubio.

El editor presenta excusas por la inicial atribución de autoría del problema a quien no era proponente, así como algunas imperfecciones en el enunciado, resueltas finalmente, y que seguramente han hecho que otras dos soluciones recibidas fueran soluciones a un problema distinto del propuesto.

**Problema 129.** Recibidas soluciones de Daniel Lasasa Medarde (Pamplona, España); Ovidiu Furdui (Kalamazoo, USA); Samuel Gómez Moreno (Jaén, España); Marcos Martinelli (Brasil); Miquel Roig (Barcelona, España); Vicente Vicario García (Huelva, España) y el proponente. Se recibió una solución incorrecta. Presentamos la solución de Samuel Gómez Moreno.

**Problema 130.** Recibida la solución de Daniel Lasasa Medarde (Pamplona, España);

### **Problemas propuestos 131-135**

#### **Divertimentos Matemáticos**

**F. Bellot:** Algunas citas de Mathematics in Fun and in Earnest, de Nathan Altshiller Court.


#### **Comentario de páginas web**

**F. Bellot:** La revista L'Enseignement Mathématique, en la red

**Editor: Francisco Bellot Rosado**

**Con el apoyo de la Subdirección General de Cooperación Internacional**





---

# INVERSIÓN EN OLIMPIADAS

APLICACIÓN DE LA INVERSIÓN A LA  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Francisco J. García Capitán

---

<http://garciacapitan.auna.com>

# Contenido

<b>1. Definición de inversión</b>	<b>1</b>
1.1. Introducción . . . . .	1
1.2. Definición de inversión . . . . .	1
<b>2. Propiedades de la inversión</b>	<b>2</b>
2.1. La inversión y las distancias . . . . .	2
2.2. La inversión y las rectas . . . . .	3
2.3. La inversión y las circunferencias . . . . .	3
2.4. La inversión y los ángulos . . . . .	5
<b>3. Circunferencias ortogonales</b>	<b>6</b>
3.1. Circunferencias ortogonales . . . . .	6
3.2. Ortogonalidad e inversión . . . . .	6
<b>4. Problemas propuestos</b>	<b>7</b>
<b>5. Soluciones a los problemas propuestos</b>	<b>8</b>
<b>6. Glosario</b>	<b>22</b>
<b>7. Nota histórica</b>	<b>22</b>



## 1. Definición de inversión

### 1.1. Introducción

Para efectuar cálculos con números grandes (por ejemplo en Astronomía) cuando no había calculadoras se usaban los logaritmos.

En efecto los logaritmos transforman los productos en sumas y las potencias en productos. Si tenemos que multiplicar dos números muy grandes, hallamos sus logaritmos, efectuamos la suma de dichos logaritmos y averiguamos a qué número corresponde ese logaritmo.

De esta manera lo que hemos hecho es transformar el problema en otro más sencillo, resolverlo, y aplicar la transformación inversa a la solución, obteniendo la solución del problema original.


Otro ejemplo sencillo de este mismo esquema es el que usamos mentalmente para calcular el MCD(60, 90). Dividimos los dos números por 10, hallamos el MCD(6, 9) = 3 y multiplicamos por 10, resultando MCD(60, 90) = 30.

La inversión, que presentamos aquí, es una transformación que se aplica a figuras del plano o del espacio (aquí nos limitaremos al plano).

### 1.2. Definición de inversión

Dada una circunferencia de centro  $O$  y radio  $k$ , la inversión de centro  $O$  y radio  $k$  es una transformación del plano que a cada punto  $A$  distinto de  $O$ , le asocia otro punto  $A'$  de la semirrecta  $OA$  cumpliendo la relación  $OA \cdot OA' = k^2$ .

La figura siguiente muestra la manera de construir el punto inverso  $A'$  del punto  $A$  cuando éste es interior a la circunferencia.



La perpendicular a la semirrecta  $OA$  determina el punto  $T$  en la circunferencia. Por este punto trazamos una tangente que corta a la semirrecta  $OA$  en el punto  $A'$ , inverso de  $A$ . En efecto, los triángulos  $OTA$  y  $OA'T$  son semejantes. Entonces,

$$\frac{OA}{OT} = \frac{OT}{OA'} \Rightarrow OA \cdot OA' = OT^2 = k^2.$$

Usando el mismo dibujo, si el punto  $A'$  está fuera de la circunferencia, trazamos una tangente a la circunferencia desde  $A'$  y, siendo  $T$  el punto de tangencia, por



$T$  trazamos una perpendicular a la recta  $OA'$  que cortará a ésta en el punto  $A$ , simétrico del punto  $A'$ .

Vemos entonces que un punto exterior a la circunferencia se transforma en un punto interior y un punto exterior a la circunferencia se transforma en un punto exterior. Los puntos de la circunferencia de inversión se invierten en sí mismos, es decir, son puntos fijos de la transformación.

Es conveniente observar que hay exactamente un punto del plano, el centro de inversión  $O$ , que se queda sin imagen por la transformación. Cuando se trabaja con inversión se supone que a todos los puntos del plano se le añade un “punto ideal” o “punto del infinito” con lo que obtenemos el *plano inversivo*. Dicho punto ideal será la imagen del centro de inversión.


## 2. Propiedades de la inversión

Las propiedades de la inversión nos permiten hacer demostraciones geométricas que no son sencillas cuando se intentan con otros métodos.

### 2.1. La inversión y las distancias

¿Como se transforman las distancias con una inversión? Sean  $A$  y  $B$  puntos distintos y sean  $A'$  y  $B'$  los inversos respecto de una circunferencia de centro  $O$  y radio  $k$ . Entonces

$$A'B' = \frac{AB \cdot k^2}{OA \cdot OB}.$$




En el caso, mostrado en la figura, en que la recta  $AB$  no pase por  $O$ , si tenemos en cuenta que  $OA \cdot OA' = k^2 = OB \cdot OB'$ , obtenemos

$$\frac{OA}{OB} = \frac{OB'}{OA'},$$

por lo que los triángulos  $OAB$  y  $OB'A'$  son semejantes. Entonces,

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{OB'}{OA} = \frac{k^2}{OA \cdot OB} \Rightarrow A'B' = \frac{AB \cdot k^2}{OA \cdot OB}.$$

En el caso de que los puntos  $O$ ,  $A$  y  $B$  estén alineados,  $A'$  y  $B'$  estarán en la misma recta:




Entonces tendremos:

$$A'B' = OB' - OA' = \frac{k^2}{OA} - \frac{k^2}{OB} = \frac{k^2}{OA \cdot OB} (OB - OA) = \frac{AB \cdot k^2}{OA \cdot OB}.$$

### 2.2. La inversión y las rectas

Es evidente que cualquier recta que pase por el centro de inversión se va a transformar en sí misma.

Por otro lado, si la recta  $l$  no pasa por el centro de inversión  $O$ , dicha recta se transforma en una circunferencia con diámetro  $OM'$ , siendo  $M$  la proyección ortogonal de  $O$  sobre  $l$  y  $M'$  el inverso de  $M$ .




En efecto, si consideremos un punto cualquiera  $A$  de la recta  $l$  y su recíproco  $A'$ , los triángulos  $OA'M'$  y  $OMA$  son semejantes, y como el ángulo  $AMM'$  es recto, también lo es el ángulo  $OA'M'$ , resultando entonces que  $A'$  está en la circunferencia con diámetro  $OM'$ .

### 2.3. La inversión y las circunferencias

La figura anterior nos sirve para averiguar cuál es el resultado de invertir una circunferencia que pasa por el centro de inversión: si  $OM'$  es un diámetro, entonces esa circunferencia se transforma en la recta perpendicular a  $OM'$  por el punto  $M$ , inverso de  $M'$ .

Vamos a hallar ahora el resultado de invertir una circunferencia que no pasa por el centro de inversión.



Supongamos que una circunferencia dada tiene radio  $r$  y sean  $P$  y  $Q$  los puntos de intersección de una recta que pasa por  $O$  y dicha circunferencia. Llamemos  $P'$  y  $Q'$  a los puntos inversos de  $P$  y  $Q$ .

Por la definición de inversión,  $OP \cdot OP' = OQ \cdot OQ' = k^2$  y por un teorema elemental de la circunferencia,  $OP \cdot OQ = |OM^2 - r^2|$ . Dividiendo estas igualdades obtenemos

$$\frac{OP'}{OQ} = \frac{OQ'}{OP} = \frac{k^2}{|OM^2 - r^2|} = \text{cte.}$$

Trazamos una paralela a  $PM$  por  $Q'$  y llamamos  $N$  a su intersección con  $OM$ . Los triángulos  $OQ'N$  y  $OPM$  son semejantes, por tener dos lados paralelos. Por tanto,

$$\frac{OQ'}{OP} = \frac{Q'N}{PM} = \frac{NO}{MO}.$$

Despejando,

$$NO = MO \cdot \frac{OQ'}{OP} = \frac{MO \cdot k^2}{|OM^2 - r^2|} = \text{cte.}$$

$$Q'N = PM \cdot \frac{OQ'}{OP} = \frac{r \cdot k^2}{|OM^2 - r^2|} = \text{cte.}$$

En este razonamiento pueden intercambiarse los puntos  $P$  y  $Q$ , para concluir que los puntos  $P'$  y  $Q'$  estarán en una circunferencia de radio  $N$  y radio constante siempre que  $P$  y  $Q$  estén en la circunferencia de centro  $M$  y radio  $r$ .

Los cálculos anteriores, además nos dan el radio  $r'$  de una circunferencia inversa de una circunferencia con centro  $M$  y radio  $r$  que no pasa por el centro de inversión:

$$r' = \frac{r \cdot k^2}{|OM^2 - r^2|}. \tag{1}$$

Para construir la circunferencia inversa de una circunferencia que no pasa por el centro de inversión, unimos el centro de inversión con el centro de la circunferencia dada mediante una recta que determina en ésta un diámetro  $AB$ . Hallamos los inversos  $A'$  y  $B'$  de  $A$  y  $B$ . La circunferencia construida con diámetro  $A'B'$  es el resultado de aplicar la inversión a la circunferencia dada.




## 2.4. La inversión y los ángulos

Una de las propiedades más útiles de la inversión es que la inversión conserva los ángulos.

El ángulo de intersección de dos curvas en un punto de intersección se define como el ángulo formado por las rectas tangentes (cuando estas tangentes existen). Esto se aplica a rectas, circunferencias o a cualquier otra curva.

En primer lugar, veamos que la inversión conserva el ángulo entre una curva y una recta que pase por el centro de inversión y el punto de tangencia.



En la figura,  $\gamma$  es una curva,  $A$  y  $B$  son puntos sobre  $\gamma$ , y  $\gamma'$ ,  $A'$  y  $B'$  son los correspondientes inversos. Como los triángulos  $AOB$  y  $B'OA'$  son semejantes, los ángulos marcados en la figura son iguales.

Ahora, suponiendo que  $B$  es un punto móvil sobre la curva y que  $B$  se va aproximando a  $A$ , las rectas  $AB$  y  $A'B'$  tienden a las tangentes en  $A$  y  $A'$  a las curvas  $\gamma$  y  $\gamma'$ . Uno de los ángulos marcados tiende al ángulo entre  $\gamma$  y  $OA$ , mientras que el otro tiende al ángulo inverso.

¿Qué ocurre con el ángulo formado por dos curvas? Basta considerar otra curva cortando a  $\gamma$  en  $A$  y aplicarle lo mismo. El ángulo formado por las dos curvas se obtendrá sumando los ángulos de cada una de ellas con la recta  $OA$ .




### 3. Circunferencias ortogonales

Las circunferencias ortogonales están íntimamente relacionadas con la inversión, por lo que dedicamos una sección a ellas.

#### 3.1. Circunferencias ortogonales

Dos circunferencias secantes son ortogonales cuando se cortan formando ángulo recto, es decir cuando sus tangentes (o los radios) en uno de los puntos de intersección son perpendiculares. Así, las circunferencias con centros  $A$  y  $B$  de la figura son perpendiculares, ya que  $\angle BTA = 90^\circ$ :



Si  $r$  y  $s$  son los radios de las circunferencias  $(A)$  y  $(B)$ , la condición de ortogonalidad equivale a que  $AB^2 = r^2 + s^2$ .

#### 3.2. Ortogonalidad e inversión

Si seguimos suponiendo que las circunferencias  $(A)$  y  $(B)$  son ortogonales, y si  $P$  y  $P'$  son dos puntos de intersección de una recta que pasa por  $A$  con la circunferencia  $(B)$ , la potencia del punto  $A$  respecto de la circunferencia  $(B)$  es  $AP \cdot AP' = AT^2 = r^2$ , por lo que  $P'$  es el punto inverso de  $(P)$  respecto de la inversión definida por la circunferencia  $(A)$ , es decir,

*Una inversión deja fija una circunferencia ortogonal a la circunferencia de inversión.*

Recíprocamente, si una circunferencia  $(B)$  contiene a un punto  $P$  y a su inverso  $P'$  respecto de la circunferencia  $(A)$  tendremos  $r^2 = AP \cdot AP' = AB^2 - s^2$ , por lo que las circunferencias serán ortogonales.



## 4. Problemas propuestos

1. Dados un punto y dos circunferencias, trazar una circunferencia que pase por el punto y que sea tangente a las dos circunferencias.
2. (Rusia, 1995). Sean una semicircunferencia con diámetro  $AB$  y centro  $O$ , y una recta que corta a la semicircunferencia en los puntos  $C$  y  $D$ , y a la recta  $AB$  en el punto  $M$  (siendo  $MD < MC$  y  $MB < MA$ ). Sea  $K$  el segundo punto de intersección de las circunferencias  $OAC$  y  $OBD$ . Demostrar que  $\angle MKO = 90^\circ$ .
3. (España, 2005). Diremos que un triángulo es multiplicativo si el producto de las longitudes de dos de sus lados es igual a la longitud del tercer lado. Sea  $ABC \dots XYZ$  un polígono regular de  $n$  lados con todos sus lados de longitud 1. Las  $n - 3$  diagonales que salen del vértice  $A$  dividen al triángulo  $ZAB$  en  $n - 2$  triángulos más pequeños. Probar que cada uno de esos triángulos es multiplicativo.
4. (Porismo de Steiner). Consideremos dos circunferencias, no concéntricas y una interior a la otra. Comenzamos por inscribir una circunferencia entre ambas, y luego vamos inscribiendo circunferencias tangentes a las dos dadas y a la última. Llegará un momento en que la circunferencia que inscribimos se solape con la primera, o bien que sea tangente a ella. Demostrar que ello no depende de la posición de la primera circunferencia inscrita.
5. (Rumanía, 1997). Sea un triángulo  $ABC$  y un punto  $D$  sobre  $BC$ . Dos circunferencias son tangentes exteriormente a  $AD$  en el mismo punto  $M$  y cada una de ellas es tangente a la circunferencia circunscrita de  $ABC$  y al lado  $BC$ , la primera sobre el segmento  $BD$  y la otra sobre el segmento  $DC$ . Demostrar que  $AD$  es la bisectriz del ángulo  $A$ .
6. (Praxis der Mathematik, prob. 546). Dado un triángulo  $ABC$  y su circunferencia circunscrita  $\gamma$ , sea  $\kappa$  la circunferencia tangente a  $\gamma$  en  $A$  y tangente a  $BC$  en un punto  $F$ . Sea  $E$  el otro punto de intersección de  $\kappa$  con el lado  $CA$  (aparte de  $A$ ). Se pide: *a*) Demostrar que la recta  $AF$  es la bisectriz del ángulo  $CAB$ . *b*) Si  $U$  y  $V$  son los dos puntos de  $\gamma$  que cumplen  $CF = CU = CV$ , demostrar que  $UV$  es tangente a la circunferencia  $\kappa$  en el punto  $E$ .
7. (Irán, 2004). Sea  $ABC$  un triángulo. Sea un punto  $X$  del interior del triángulo y sea  $Y$  la intersección de  $AX$  y  $BC$ . Tracemos las perpendiculares  $YP$ ,  $YQ$ ,  $YR$ ,  $YS$  a las rectas  $CA$ ,  $CX$ ,  $BX$ ,  $BA$  respectivamente. Hallar la condición necesaria y suficiente que debe cumplir  $X$  para que  $PQRS$  sea un cuadrilátero cíclico.



8. Sean  $ABC$  un triángulo y  $D, E, F$  los puntos de contacto de la circunferencia inscrita con los lados  $BC, CA$  y  $AB$ , respectivamente. Demostrar que la inversión respecto de la circunferencia inscrita transforma la circunferencia circunscrita a  $ABC$  en la circunferencia de los nueve puntos de  $DEF$ .
9. (Euler) Si  $R$  y  $r$  son los radios de las circunferencias circunscritas e inscritas a un triángulo y  $O$  e  $I$  son su circuncentro e incentro, entonces  $OI^2 = R^2 - 2Rr$ .
10. (Competición Matemática Mediterránea, 2005).  $k$  y  $k'$  son dos circunferencias concéntricas, de centro  $O$  y radios respectivos  $R$  y  $R'$ . Se supone que  $R < R'$ . Una semirrecta  $Ox$  corta a  $k$  en el punto  $A$ ; la semirrecta opuesta  $Ox'$  corta a  $k'$  en el punto  $B$ . Una tercera semirrecta  $Ot$ , distinta de las anteriores, corta a  $k$  en  $E$  y a  $k'$  en  $F$ . Demostrar que las cuatro circunferencias siguientes se cortan en un mismo punto:
  - a) La circunscrita al triángulo  $OAE$ .
  - b) La circunscrita al triángulo  $OBF$ .
  - c) La de diámetro  $EF$ .
  - d) Y la de diámetro  $AB$ .
11. (Teorema de las Siete Circunferencias). Supongamos que las circunferencias  $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4, \Gamma_5, \Gamma_6$  son tangentes a una circunferencia  $\Gamma$  en los puntos  $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$  respectivamente, y cada una de ellas es también tangente a la anterior y a la siguiente (entendemos que  $\Gamma_1$  es la siguiente de  $\Gamma_6$  y que  $\Gamma_6$  es la anterior a  $\Gamma_1$ ). Entonces, las rectas  $A_1A_4, A_2A_5$  y  $A_3A_6$  son concurrentes.

## 5. Soluciones a los problemas propuestos


Para resolver un problema de inversión debemos elegir adecuadamente el centro y el radio de inversión. A veces, el radio de inversión puede ser cualquiera.

Suele ser conveniente elegir como centro de inversión un punto de tangencia de dos circunferencias, ya que éstas se convertirán en dos rectas paralelas.

Como en otras áreas, es la práctica la que realmente nos enseña a abordar el problema.




**Problema 1.** *Dados un punto y dos dos circunferencias, trazar una circunferencia que pase por el punto y que sea tangente a las dos circunferencias.*



*Solución.* En la figura  $A$  es el punto dado y las circunferencias dadas tienen centros  $B$  y  $C$ . Consideramos como circunferencia de inversión la que está centrada en  $A$  y es ortogonal a  $(B)$ . De esa manera  $(B)$  será fija. Hallamos la circunferencia inversa de  $(C)$  y una tangente común a dicha circunferencia inversa y a la circunferencia  $(B)$ . Bastará invertir la recta obtenida para hallar la circunferencia buscada.



**Problema 2.** (Rusia, 1995). Sean una semicircunferencia con diámetro  $AB$  y centro  $O$ , y una recta que corta a la semicircunferencia en los puntos  $C$  y  $D$ , y a la recta  $AB$  en el punto  $M$  (siendo  $MD < MC$  y  $MB < MA$ ). Sea  $K$  el segundo punto de intersección de las circunferencias  $OAC$  y  $OBD$ . Demostrar que  $\angle MKO = 90^\circ$ .



*Solución.* Consideramos la inversión de centro  $A$  y radio  $OA$ . La recta  $AB$  es fija. Las circunferencias  $OAC$  y  $OBD$  se transforman en las rectas  $AC$  y  $BD$ , que se cortan en  $K'$ , punto inverso de  $K$ . La recta  $CD$  se transforma en una circunferencia que pasa por  $C$ ,  $D$ ,  $O$ , y esta circunferencia corta a la recta  $AB$  en el punto  $M'$ , inverso de  $M$ .

Como  $AD$  y  $BC$  son perpendiculares a  $BK'$  y  $AK'$  respectivamente y además  $O$  es el punto medio de  $AB$ , la circunferencia  $CDO$  es la circunferencia de los nueve puntos del triángulo  $AK'B$ , así que también  $K'M'$  es perpendicular a  $AB$ , es decir  $\angle K'M'O = 90^\circ$ . En consecuencia, también es  $\angle MKO = 90^\circ$ .



**Problema 3.** (España, 2005). Diremos que un triángulo es multiplicativo si el producto de las longitudes de dos de sus lados es igual a la longitud del tercer lado. Sea  $ABC \dots XYZ$  un polígono regular de  $n$  lados con todos sus lados de longitud 1. Las  $n - 3$  diagonales que salen del vértice  $A$  dividen al triángulo  $ZAB$  en  $n - 2$  triángulos más pequeños. Probar que cada uno de esos triángulos es multiplicativo.


*Solución.* En la figura de la derecha hemos representado el caso de un octógono  $ABCDEFGH$ , pero el razonamiento es válido para cualquier polígono.

Consideremos una inversión con centro  $A$  y radio de inversión  $r = 1$ . La circunferencia circunscrita al polígono pasa por el centro de inversión, por lo que su imagen es una recta, la recta  $BH$  que pasa por los puntos de intersección de ambas.

Consideremos los triángulos  $AUV$  y  $ACD$ , y apliquemos la fórmula que relaciona las longitudes de segmentos transformados por una inversión,


$$1 = CD = UV \cdot \frac{r^2}{AU \cdot AV} = \frac{UV}{AU \cdot AV}.$$

Entonces,  $UV = AU \cdot AV$  y el triángulo  $AUV$  es multiplicativo.






**Problema 4.** (*Porismo de Steiner*). Consideremos dos circunferencias, no concéntricas y una interior a la otra. Comenzamos por inscribir una circunferencia entre ambas, y luego vamos inscribiendo circunferencias tangentes a las dos dadas y a la última. Llegará un momento en que la circunferencia que inscribamos se solape con la primera, o bien que sea tangente a ella. Demostrar que ello no depende de la posición de la primera circunferencia inscrita.




*Solución.* El problema se resuelve de forma trivial si las circunferencias dadas son concéntricas. Por tanto, basta considerar una inversión que transforme las dos circunferencias dadas en dos circunferencias concéntricas.






**Problema 5.** (Rumanía, 1997). Sea un triángulo  $ABC$  y un punto  $D$  sobre  $BC$ . Dos circunferencias son tangentes exteriormente a  $AD$  en el mismo punto  $M$  y cada una de ellas es tangente a la circunferencia circunscrita de  $ABC$  y al lado  $BC$ , la primera sobre el segmento  $BD$  y la otra sobre el segmento  $DC$ . Demostrar que  $AD$  es la bisectriz del ángulo  $A$ .



*Solución.* Supongamos que la recta que une los centros de las dos circunferencias corta a la recta  $BC$  en  $T$ . Consideremos la inversión de centro  $A$  y radio  $AM$ . Esta inversión deja fijas a las dos circunferencias y transforma la circunferencia circunscrita a  $ABC$  en la otra tangente común a las dos circunferencias. El cuadrilátero  $BCC'B'$  formado por los vértices  $B$  y  $C$  y sus inversos es cíclico, y un cálculo sencillo de ángulos conduce a que las bisectrices de  $\angle BTB'$  y  $\angle BAC$  son perpendiculares. Pero por otro lado,  $TM$  es la bisectriz de  $BTB'$  y  $AM \perp TM$ . Esto implica que  $AM$  debe ser la bisectriz del ángulo  $A$ , que es lo que queríamos demostrar.



**Problema 6.** (*Praxis der Mathematik, prob. 546*). Dado un triángulo  $ABC$  y su circunferencia circunscrita  $\gamma$ , sea  $\kappa$  la circunferencia tangente a  $\gamma$  en  $A$  y tangente a  $BC$  en un punto  $F$ . Sea  $E$  el otro punto de intersección de  $\kappa$  con el lado  $CA$  (aparte de  $A$ ). Se pide: a) Demostrar que la recta  $AF$  es la bisectriz del ángulo  $CAB$ . b) Si  $U$  y  $V$  son los dos puntos de  $\gamma$  que cumplen  $CF = CU = CV$ , demostrar que  $UV$  es tangente a la circunferencia  $\kappa$  en el punto  $E$ .




*Solución.* Para la parte a), calculemos ángulos. Sea  $X$  un punto de la tangente a la circunferencia circunscrita por  $A$ , de manera que la recta  $AB$  separe a  $C$  y  $X$ . Entonces tenemos

$$\begin{aligned} \angle BAF &= \angle XAF - \angle XAB = \angle AEF - \angle ACB = \\ &= \angle AEF - \angle ECF = \angle EFC = \angle FAE = \angle FAC. \end{aligned}$$

Por tanto,  $\angle BAF = \angle CAF$ . Para demostrar b), consideremos la inversión respecto de la circunferencia  $\omega$  con centro  $C$  y radio  $CF$ . Las circunferencias  $\omega$  y  $\kappa$  son ortogonales, por lo que  $\kappa$  es fija. Por otro lado, la recta  $UV$  es inversa de  $\gamma$ . El punto  $A'$  inverso de  $A$  debe ser el punto de tangencia de la recta  $UV$  y la circunferencia  $\kappa$ , y además debe estar en la recta  $AC$ , por ser  $C$  el centro de inversión y  $A, A'$  dos puntos inversos, así que debe ser  $A' = E$  y  $UV$  es tangente a  $\kappa$  en  $E$ .



**Problema 7.** (Irán, 2004). Sea  $ABC$  un triángulo. Sea un punto  $X$  del interior del triángulo y sea  $Y$  la intersección de  $AX$  y  $BC$ . Tracemos las perpendiculares  $YP$ ,  $YQ$ ,  $YR$ ,  $YS$  a las rectas  $CA$ ,  $CX$ ,  $BX$ ,  $BA$  respectivamente. Hallar la condición necesaria y suficiente que debe cumplir  $X$  para que  $PQRS$  sea un cuadrilátero cíclico.




*Solución.* Consideremos una inversión con centro  $Y$  y radio cualquiera. Observemos que la circunferencia con diámetro  $BY$  contiene a los puntos  $R$  y  $S$ , y esta circunferencia se transformará en la recta  $R'S'$ , perpendicular a  $BC$ . De forma análoga, la circunferencia con diámetro  $YC$  contiene a los puntos  $P$  y  $Q$ , y la recta  $PQ$  y dicha circunferencia se transforma en la recta  $P'Q'$ , perpendicular a  $BC$ . Asimismo, las circunferencias  $YRQ$  e  $YPS$  se invierten en dos rectas paralelas, perpendiculares las dos a la recta  $AY$ . Deducimos por tanto que  $P'Q'R'S'$  es un paralelogramo.

Ahora, el cuadrilátero  $PQRS$  será cíclico si y solo si  $P'Q'R'S'$  lo es, y al ser un paralelogramo, esto ocurrirá si y sólo si  $P'Q'R'S'$  es un rectángulo, es decir, cuando  $AX$  sea perpendicular a  $BC$ .

Como conclusión,  $PQRS$  es un cuadrilátero cíclico si y solo si  $AX$  y  $BC$  son perpendiculares.



**Problema 8.** Sean  $ABC$  un triángulo y  $D, E, F$  los puntos de contacto de la circunferencia inscrita con los lados  $BC, CA$  y  $AB$ , respectivamente. Demostrar que la inversión respecto de la circunferencia inscrita transforma la circunferencia circunscrita a  $ABC$  en la circunferencia de los nueve puntos de  $DEF$ .



*Solución.* Sea  $I$  y  $r$  el centro y el radio de la circunferencia inscrita a  $ABC$ . Consideremos la inversión respecto de esta circunferencia. Sean  $X, Y, Z$  los puntos medios de los lados  $DE, EF, FD$  del triángulo  $DEF$ . Por ser  $E$  y  $F$  los puntos de tangencia de las rectas tangentes desde  $A$  a la circunferencia inscrita, ambos puntos son simétricos respecto de la bisectriz  $AI$ . De otro modo, el triángulo  $AEF$  es isósceles y la perpendicular a  $EF$  por  $A$  pasa por su punto medio  $X$ , es decir  $\angle IXE = 90^\circ$ . También es  $\angle IEA = 90^\circ$ , resultando evidente que los triángulos  $IEA$  e  $IXE$  son semejantes. Entonces tenemos


$$\frac{IX}{IE} = \frac{IE}{IA} \Rightarrow IX \cdot IA = IE^2 = r^2.$$

Esto quiere decir que  $A$  y  $X$  son puntos inversos. De la misma forma se comprueba que  $B$  e  $Y, C$  y  $Z$  también lo son.

Deducimos entonces que la circunferencia  $ABC$  se transforma en la circunferencia  $XYZ$ ,



**Problema 9.** (Euler) Si  $R$  y  $r$  son los radios de las circunferencias circunscritas e inscritas a un triángulo y  $O$  e  $I$  son su circuncentro e incentro, entonces  $OI^2 = R^2 - 2Rr$ .



*Solución.* Consideremos la inversión con centro  $I$  y radio  $r$ . La circunferencia inscrita es fija, y la circunferencia circunscrita (con radio  $R$ ) se transforma en la circunferencia de los nueve puntos del triángulo  $DEF$ , siendo  $D, E, F$  los puntos de contacto de la circunferencia inscrita con los lados  $AB, BC, CA$  del triángulo  $ABC$ . El radio de esta circunferencia es  $\frac{r}{2}$ .

Sabemos que el resultado de una inversión de centro  $P$  y radio  $k$  sobre una circunferencia  $\mathcal{C}$  equivale al de una homotecia centrada en  $P$  con razón igual al cociente entre  $k^2$  y la potencia de  $P$  respecto de  $\mathcal{C}$ . Considerando como  $\mathcal{C}$  a la circunferencia circunscrita a  $ABC$  y nuestra inversión de centro  $I$  y radio  $r$ , tendremos

$$\frac{\frac{r}{2}}{R} = \frac{r^2}{R^2 - OI^2},$$


de donde deducimos  $OI^2 = R^2 - 2Rr$ .



**Problema 10.** (*Competición Matemática Mediterránea, 2005*).  $k$  y  $k'$  son dos circunferencias concéntricas, de centro  $O$  y radios respectivos  $R$  y  $R'$ . Se supone que  $R < R'$ . Una semirrecta  $Ox$  corta a  $k$  en el punto  $A$ ; la semirrecta opuesta  $Ox'$  corta a  $k'$  en el punto  $B$ . Una tercera semirrecta  $Ot$ , distinta de las anteriores, corta a  $k$  en  $E$  y a  $k'$  en  $F$ . Demostrar que las cuatro circunferencias siguientes se cortan en un mismo punto:

1. La circunscrita al triángulo  $OAE$ .
2. La circunscrita al triángulo  $OBF$ .
3. La de diámetro  $EF$ .
4. Y la de diámetro  $AB$

*Solución:* Consideramos la inversión de centro  $O$ , de radio  $\sqrt{RR'}$  que transforma las circunferencias concéntricas una en otra.  $E$  y  $F$  resultan ser puntos inversos. Sean  $A'$  y  $B'$  los inversos de  $A$  y  $B$  respectivamente.  $A'$  estará en  $k'$  y  $B'$  estará en  $k$ :



Entonces:



1. Las circunferencias  $OAE$  y  $OBF$  pasan por el centro de inversión, así que se transforman en rectas,  $OAE$  se transforma en la recta  $A'F$  y  $OBF$  se transforma en la recta  $B'E$ .
2. La circunferencia con diámetro  $EF$  es fija.
3. La circunferencia con diámetro  $AB$  se transforma en la circunferencia con diámetro  $A'B'$ .

Por ser inversos  $E$  y  $F$ ,  $A$  y  $A'$ , los triángulos  $OEA$  y  $OFA'$  son semejantes, e isósceles, así que  $A'F$  es paralela a  $AE$ . Como  $AE$  forma con  $B'E$  un ángulo recto, por estar  $E$  en la circunferencia con diámetro  $B'A$ , la recta  $A'F$  que hemos dicho que paralela a  $AE$  también formará ángulo recto con  $B'E$ . El punto de intersección  $J$  de  $A'F$  y  $B'E$  estará por tanto en la circunferencia con diámetro  $B'A$ .


El ángulo  $EJF$ , opuesto a  $A'JB'$  también será recto y por tanto,  $J$  también estará en la circunferencia con diámetro  $EF$ .

Entonces, el punto  $J$  es común a: la circunferencia con diámetro  $EF$ ; la circunferencia con diámetro  $A'B'$ ; la recta  $A'F$ ; y la recta  $B'E$ .

En consecuencia, el punto  $K$ , inverso  $K$  será común a: la circunferencia  $EF$ ; la circunferencia con diámetro  $AB$ , la recta  $BF$ ; y la recta  $BF$ , que es lo que queríamos demostrar.



**Problema 11.** (*Teorema de las Siete Circunferencias*). Supongamos que las circunferencias  $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4, \Gamma_5, \Gamma_6$  son tangentes a una circunferencia  $\Gamma$  en los puntos  $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$  respectivamente, y cada una de ellas es también tangente a la anterior y a la siguiente (entendemos que  $\Gamma_1$  es la siguiente de  $\Gamma_6$  y que  $\Gamma_6$  es la anterior a  $\Gamma_1$ ). Entonces, las rectas  $A_1A_4, A_2A_5$  y  $A_3A_6$  son concurrentes.




*Solución.* Llamemos  $i$  a la inversión respecto de una circunferencia con centro  $A_1$ .

Las circunferencias  $\Gamma_1$  y  $\Gamma$ , que pasan por  $A_1$ , se transforman en dos rectas paralelas, y las circunferencias  $\Gamma_2$  y  $\Gamma_6$ , que son tangentes tanto a  $\Gamma_1$  como  $\Gamma$  se transformarán en dos circunferencias con el mismo radio.

Ahora tenemos que a) La recta  $A_1A_4$  es fija. b) La recta  $A_2A_5$  se transforma en la circunferencia circunscrita a  $A_1, i(A_2)$  e  $i(A_5)$ . c) La recta  $A_3A_6$  se transforma en la circunferencia circunscrita a  $A_1, i(A_3)$  e  $i(A_6)$ .

Que las tres rectas  $A_1A_4, A_2A_5$  y  $A_3A_6$  son concurrentes equivale entonces a que sus transformados tengan algún punto común además de  $A_1$ . Esto ocurrirá si la recta  $A_1A_4$  sea el eje radical de las circunferencias circunscritas a  $A_1, i(A_2)$  e





$i(A_5)$  y a  $A_1$ ,  $i(A_3)$  e  $i(A_6)$ . Para comprobarlo, veremos que el punto  $i(A_4)$ , que pertenece a la recta  $A_1A_4$ , tiene la misma potencia respecto de las dos circunferencias, es decir, veremos que

$$i(A_4)i(A_2) \cdot i(A_4)i(A_5) = i(A_4)i(A_3) \cdot i(A_4)i(A_6).$$

Usaremos que el segmento de tangente común a dos circunferencias tangentes con radios  $r_1$  y  $r_2$  es  $2\sqrt{r_1r_2}$ , que se obtiene fácilmente usando el teorema de Pitágoras.

Llamando  $r_i$  al radio de  $\Gamma_i$ , tenemos

$$\begin{aligned} i(A_4)i(A_2) \cdot i(A_4)i(A_5) &= - (2\sqrt{r_3r_4} + 2\sqrt{r_2r_3}) \cdot 2\sqrt{r_4r_5} = \\ &= - 4\sqrt{r_2r_3r_4r_5} - 4r_4\sqrt{r_3r_5}, \\ i(A_4)i(A_3) \cdot i(A_4)i(A_6) &= - 2\sqrt{r_4r_3} \cdot (2\sqrt{r_4r_5} + 2\sqrt{r_5r_6}) = \\ &= - 4r_4\sqrt{r_3r_5} - \sqrt{r_3r_4r_5r_6}. \end{aligned}$$

y usando que  $r_2 = r_6$  vemos que las dos potencias son iguales.



## 6. Glosario

**Ángulo inscrito.** Un ángulo se llama inscrito si tiene su vértice en la circunferencia y los lados secantes a la circunferencia. El ángulo semiinscrito tiene uno de los lados secante y el otro tangente y puede considerarse como un caso límite del ángulo inscrito. Un ángulo inscrito o semiinscrito mide la mitad que el arco que comprende. En particular, *un ángulo inscrito que abarca un diámetro es recto*.

**Cuadrilátero cíclico.** Un cuadrilátero se llama cíclico si tiene los cuatro vértices en una misma circunferencia. En un cuadrilátero cíclico la suma de los ángulos opuestos es  $180^\circ$ .

**Potencia de un punto respecto de una circunferencia.** Sean  $P$  un punto,  $\mathcal{C}$  una circunferencia y  $A, B$  los puntos de corte de cualquier recta que pasa por  $P$  con la circunferencia. Entonces el producto  $PA \cdot PB$  no depende de  $A$  y  $B$  y se llama potencia de  $P$  respecto de  $\mathcal{C}$ .

**Eje radical de dos circunferencias.** Es una recta formada por los puntos que tienen la misma potencia respecto de las dos circunferencias. Si las circunferencias son secantes, es la recta que pasa por los dos puntos de intersección.

**Circunferencia de los nueve puntos.** En cualquier triángulo, los puntos medios de los lados, los pies de las alturas y los puntos medios de los segmentos que unen el ortocentro y los vértices, están en una misma circunferencia, llamada circunferencia de los nueve puntos o circunferencia de Euler. Tiene su centro en el punto medio entre el ortocentro y el circuncentro, y su radio es exactamente la mitad que el de la circunferencia circunscrita.

## 7. Nota histórica

Según dice Howard Eves [3], la historia de la inversión es compleja. François Viète ya hablaba de puntos inversamente relacionados en el siglo XVI. Robert Simson, en su restauración de la obra perdida *Lugares planos* de Apolonio incluyó, basándose en un comentario hecho por Pappus, uno de los teoremas básicos de la teoría de inversión, el de que el inverso de una recta o una circunferencia es también una recta o una circunferencia. Simon A. J. L'Huilier (1750-1840) en sus *Éléments d'analyse géométrique et d'analyse algébrique appliquées à la recherche des lieux géométriques* (París y Génova, 1808) dio casos especiales de este teorema.

Pero la inversión como una transformación para simplificar el estudio de figuras data de tiempos más recientes, y fue utilizada independientemente por varios autores. Bützberger remonta el uso de la inversión por parte de Jakob Steiner a 1824.

Patterson [5] apunta la siguiente cronología:



- 1822 Dandelin publica su Tableau Comparatif para la hipérbola y la focal.
- 1823 Quetelet compara caústicas secundarias y cónicas a la manera de Dandelin
- 1824 Steiner habla de inversión en un manuscrito no publicado hasta 1913.
- 1825 Dandelin deduce la relación  $rr' = R^2$  correspondiente a radio vectores de lemniscatas y cónicas, dando lugar a una nueva construcción de aquellas.
- 1825 Quetelet define la inversa de una curva.
- 1831 Plücker explica sus *neues Übertragungs-Princip*, que fue publicado en 1834
- 1836 Bellavitis dio una exposición completa de la teoría de las figuras inversas.
- 1845 Lord Kelvin la aplica a sus estudios sobre elasticidad.

## Referencias

- [1] *Art of Problem Solving*. Foro de discusión sobre resolución de problemas. Pueden verse muchos y buenos problemas sobre una gran gama de temas y varios niveles de dificultad. <http://www.artofproblemsolving.com/>
- [2] Coxeter, H. S. M., Greitzer, S. L. *Geometry Revisited*. Washington, DC: Mathematical Association of America, 1967.
- [3] Eves, H. W. *A Survey of Geometry*. Boston, MA: Allyn and Bacon, 1972.
- [4] Ogilvy, C. S. *Excursions in Geometry*. New York: Dover, pp. 143-153, 1990.
- [5] Patterson, Boyd C.: "The Origins of the Geometric Principle of Inversion". *Isis*, Vol. 19, No. 1. (Apr., 1933), págs. 154-180.
- [6] Stankova-Frenkel, Z. *Inversion in the Plane. Part I and II*. Disponible en <http://math.berkeley.edu/~stankova/MathCircle/sessions-index.html>

### PROBLEMAS DE NIVEL MEDIO Y DE OLIMPIADAS (27)

Presentamos cinco problemas propuestos en la Olimpiada Zhautykov 2006, Alma Ata, Kirguistán.

27-1. Hallar todos los enteros positivos  $n$  tales que  $n = \varphi(n) + 402$ , donde  $\varphi$  es la función de Euler (es conocido que si  $p_1, \dots, p_k$  son todos los diferentes divisores primos de  $n$ , entonces

$$\varphi(n) = n \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right), \text{ y } \varphi(1) = 1.)$$

27-2. Los puntos K y L están en los lados AB y AC, respectivamente, del triángulo ABC, de tal manera que  $BK = CL$ . Sea P el punto de intersección de BL y CK, y sea M un punto interior al segmento AC tal que la recta MP sea paralela a la bisectriz del ángulo A del triángulo ABC. Demostrar que  $CM = AB$ .

27-3. Una tabla  $m \times n$  ( $4 \leq m \leq n$ ) se llamará *buena* si los números 0 y 1 se pueden situar en los cuadrados unidad de la tabla verificando las condiciones siguientes:

- 1) no todos los números son ceros ni todos los números son unos.
- 2) El número de "unos" en cualquier cuadrado  $3 \times 3$  es el mismo.
- 3) El número de "unos" en cualquier cuadrado  $4 \times 4$  es el mismo, también.

Hallar todos los pares  $(m, n)$  ( $4 \leq m \leq n$ ) para los cuales existe una tabla *buena*  $m \times n$ .

27-4. Si la suma de los números reales  $a, b, c, d$  es cero, demostrar la desigualdad

$$(ab + ac + ad + bc + bd + cd)^2 + 12 \geq 6(abc + abd + acd + bcd).$$

27-5. En el hexágono convexo ABCDEF se tiene

$$AD = BC + EF, \quad BE = AF + CD, \quad CF = DE + AB.$$

Demostrar que

$$\frac{AB}{DE} = \frac{CD}{AF} = \frac{EF}{BC}.$$

## Problemas de nivel medio y de Olimpiadas (26)

### Problemas de la segunda fase de la Olimpiada Británica 2005

26-2: En el triángulo  $ABC$ ,  $\angle BAC = 120^\circ$ . Las bisectrices interiores de los ángulos  $A$ ,  $B$  y  $C$  cortan a los lados opuestos en  $D$ ,  $E$  y  $F$ , respectivamente. Demostrar que la circunferencia de diámetro  $EF$  pasa por  $D$ .

Solución de Bruno Salgueiro Fanego (Viveiro, Lugo, Galicia, España)

Sea  $C$  la circunferencia de diámetro  $EF$ . Entonces  $D$  estará en  $C$  si y sólo si  $\angle EDF$  es un ángulo inscrito en  $C$  que abarca un diámetro suyo, es decir, si y sólo si  $\angle EDF = 90^\circ$ , que equivale a que  $DEF$  sea un triángulo rectángulo en  $D$  o a que  $DE^2 + DF^2 = EF^2$ .

Aplicando el teorema del coseno en  $ADE$  y en  $ADF$ , resulta:

$$DE^2 = AD^2 + AE^2 - 2 \cdot AD \cdot AE \cdot \cos 60^\circ \text{ y } DF^2 = AD^2 + AF^2 - 2 \cdot AD \cdot AF \cdot \cos 60^\circ, \text{ luego} \\ DE^2 + DF^2 = 2 \cdot AD^2 + AE^2 + AF^2 - AD \cdot (AE + AF).$$

Aplicando el teorema del coseno en  $AEF$ , resulta:

$$EF^2 = AE^2 + AF^2 - 2 \cdot AE \cdot AF \cdot \cos 120^\circ, \text{ con lo cual el problema reside en probar la igualdad} \\ 2 \cdot AD^2 - AD \cdot (AE + AF) = AE \cdot AF. \text{ Pero}$$

$$\frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin 120^\circ = [ABC] = [ABD] + [CAD] = \frac{1}{2} \cdot c \cdot AD \cdot \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \cdot b \cdot AD \cdot \sin 60^\circ \Rightarrow AD = \frac{bc}{b+c} \text{ y,}$$

por el teorema de la bisectriz interior,

$$\frac{AE}{b-AE} = \frac{c}{a} \Rightarrow AE = \frac{bc}{c+a} \text{ y } \frac{AF}{c-AF} = \frac{b}{a} \Rightarrow AF = \frac{bc}{a+b}.$$

Entonces hay que probar que

$$2 \frac{b^2 c^2}{(b+c)^2} - \frac{bc}{b+c} bc \frac{2a+b+c}{(c+a)(a+b)} = \frac{b^2 c^2}{(c+a)(a+b)}$$

o bien, dividiendo entre  $b^2 c^2$  y quitando denominadores, que

$$2(a+b)(c+a) - (2a+b+c)(b+c) = (b+c)^2, \text{ es decir, que}$$

$$2(a^2 + bc) = 2(b+c)^2 \text{ o bien que } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos 120^\circ,$$

lo cual es cierto por el teorema del coseno aplicado al triángulo  $ABC$ .

## Problemas de nivel medio y de Olimpiadas (26)

### Problemas de la segunda fase de la Olimpiada Británica 2005

26-3: Sean  $a, b, c$  números reales positivos. Demostrar que

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right)^2 \geq (a+b+c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$$

Solución de Bruno Salgueiro Fanego (Viveiro, Lugo, Galicia, España)

Hay que demostrar que

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 + \left(\frac{c}{a}\right)^2 + 2\left(\frac{ab}{bc} + \frac{bc}{ca} + \frac{ca}{ab}\right) \geq a\frac{1}{a} + b\frac{1}{b} + c\frac{1}{c} + \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right) + \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b}\right) + \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{c}\right), \text{ esto es,}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 + \left(\frac{c}{a}\right)^2 + 2\frac{a}{c} + 2\frac{b}{a} + 2\frac{c}{b} \geq 3 + \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right) + \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b}\right) + \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{c}\right) \text{ o bien}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 - \frac{a}{b} + \frac{1}{\frac{a}{b}} + \left(\frac{b}{c}\right)^2 - \frac{b}{c} + \frac{1}{\frac{b}{c}} + \left(\frac{c}{a}\right)^2 - \frac{c}{a} + \frac{1}{\frac{c}{a}} \geq 3.$$

Luego bastará con demostrar que, si  $x$  es un número real positivo, se cumple que  $x^2 - x + \frac{1}{x} \geq 1$  y

sumar las tres igualdades resultantes tomando  $x = \frac{a}{b}$ ,  $x = \frac{b}{c}$  y  $x = \frac{c}{a}$ .

Y ello es cierto, dándose además la igualdad sólo y cuando  $x = 1$  porque, si  $x > 0$ ,

$$x^2 - x + \frac{1}{x} - 1 = \frac{1}{x}(x^3 - x^2 - x + 1) = \frac{1}{x}[x^2(x-1) - (x-1)] = \frac{1}{x}(x^2 - 1)(x-1) = \frac{1}{x}(x+1)(x-1)^2 \text{ y } \frac{1}{x} > 0,$$

$x+1 > 0$  y  $(x-1)^2 \geq 0$ , con  $(x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ .

Por tanto, la desigualdad del enunciado está demostrada, y en ella se da la igualdad si y sólo si  $\frac{a}{b} = 1$ ,

$\frac{b}{c} = 1$  y  $\frac{c}{a} = 1$ , es decir, si y sólo si  $a = b = c$ .

## PROBLEMAS PARA LOS MÁS JÓVENES (27)

La Sociedad Rumana de Ciencias Matemáticas acaba de poner a la venta la colección completa (1894-2004), en edición electrónica, de la revista *Gazeta Matematica, serie B*.

Presentamos cinco problemas rumanos para los alumnos de 11 a 14 años:

Prjov 27-1: El número  $\alpha$  es de la forma  $10 +$  múltiplo de  $19$ . Demostrar que no puede ser ni cuadrado ni cubo perfecto.

Prjov 27-2: La suma de tres números primos consecutivos es también primo. Calcularlos.

Prjov27-3: En el triángulo ABC, el ángulo A es de  $60^\circ$ . Sea S el punto medio de la bisectriz AP, donde P es un punto del lado BC. Se sabe que el ángulo SBA es de  $30^\circ$ .

i) ¿Cuál es el centro de la circunferencia que pasa por A, B y P?

ii) ¿Es  $AB = AP$ ?

iii) ¿son iguales PC y PB?

iv) ¿Es BS la mediana de ABC correspondiente al vértice B?

Prjov27-4: Resolver, en el conjunto de los números naturales, la ecuación

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n + 241 = m^2.$$

Projov27-5: Hallar todos los polígonos regulares que tienen todas sus diagonales iguales.

## Solución al Problema 116 bis

Samuel Gómez Moreno,  
Departamento de Matemáticas, Universidad de Jaén.  
samuel@ujaen.es

### PROBLEMA 116 bis

Sean  $x$  e  $y$  números reales tales que

$$\sqrt{x^2 - 3x} + \sqrt{y^2 - 3y} = 1.$$

Demostrar que

$$x^2 + y^2 < 2(x + y) + 15.$$

### SOLUCIÓN

Designemos  $a = \sqrt{x^2 - 3x}$ . Entonces es claro que  $\sqrt{y^2 - 3y} = 1 - a$ , que  $0 \leq a \leq 1$  y que  $0 \leq 1 - a \leq 1$ . Además

$$x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 4a^2}}{2}, \quad \text{y también} \quad y_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{13 - 4a(2 - a)}}{2}.$$

Por tanto, como es inmediato comprobar, obtenemos que

$$x^2 + y^2 - 2(x + y) = \frac{1}{2} \left( 8 - 4a(1 - a) \pm \sqrt{13 - 4a(2 - a)} \pm \sqrt{9 + 4a^2} \right). \quad (1)$$

Teniendo en cuenta que, para  $0 \leq a \leq 1$ , se verifican las desigualdades  $0 \leq a(1 - a) \leq 1/4$ ,  $0 \leq a(2 - a) \leq 1$  y  $0 \leq a^2 \leq 1$ , obtenemos de modo inmediato que

$$7 \leq 8 - 4a(1 - a) \leq 8, \quad 3 \leq \sqrt{13 - 4a(2 - a)} \leq \sqrt{13}, \quad 3 \leq \sqrt{9 + 4a^2} \leq \sqrt{13}.$$

Haciendo uso, en la expresión (1), de las tres acotaciones anteriores, obtenemos tres cotas superiores para  $x^2 + y^2 - 2(x + y)$ : si consideramos los dobles signos que aparecen en (1) ambos positivos, la cota que resulta es

$4 + \sqrt{13}$ ; si consideramos los dobles signos uno positivo y otro negativo, la cota obtenida es  $(5 + \sqrt{13})/2$ ; y si los dobles signos los consideramos ambos negativos, la cota obtenida es, entonces, 1. La mayor de las tres cotas es  $4 + \sqrt{13}$ , que verifica  $4 + \sqrt{13} < 7.6056 < 15$ . Por tanto hemos mejorado la desigualdad que pretendíamos probar, ya que hemos establecido que

$$x^2 + y^2 - 2(x + y) \leq 4 + \sqrt{13}.$$

## SOLUCIÓN PROPUESTA

**Luis Gómez Sánchez A.**  
**Universidad de Oriente, Venezuela.**  
**lagsa7@hotmail.com**  
**Jirón A. Tovar # 267,**  
**01 La Punta, Callao, PERÚ.**

### Problema 116 bis (corrección).

Propuesto por Doru Popescu Anastasiu (Slatina, Rumania) y Miguel Amengual Covas (Cala Figuera, España)

Sean  $x$  e  $y$  números reales tales que


$$\sqrt{x^2 - 3x} + \sqrt{y^2 - 3y} = 1.$$

Demostrar que

$$x^2 + y^2 < 2(x + y) + 15.$$

**SOLUCIÓN.-** Como el dominio de definición de  $(x^2 - 3x)^{1/2}$  es  $\{x \leq 0 \text{ ó } x \geq 3\}$ , el correspondiente dominio de la función  $F(x, y) = (x^2 - 3x)^{1/2} + (y^2 - 3y)^{1/2}$ , de  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$  en  $\mathbf{R}$ , está dado por la unión de cuadrantes disjuntos  $D = \{x \leq 0; y \leq 0\} \cup \{x \leq 0; y \geq 3\} \cup \{x \geq 3; y \leq 0\} \cup \{x \geq 3; y \geq 3\}$ .

Ahora, como  $f(x) = x^2 - 3x$  es, respectivamente, creciente y decreciente a la derecha y a la izquierda del punto  $x = 3/2$  que no está en  $D$ , los dos radicales que definen  $F$  recorren cada uno todos los valores del intervalo cerrado  $[0, 1]$ ; además, las raíces de  $x^2 - 3x = 1$ , (que se corresponden claramente con las raíces de  $y^2 - 3y = 0$  en la curva  $F(x, y) = 1$ ) son  $x_1 = 3.3027$  y  $x_2 = -0.3027$ , donde se ha aproximado el valor de  $\sqrt{13}$ . Se deduce que los puntos de  $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$  tales que  $F(x, y) = 1$  están contenidos en los cuadrados de lado igual a  $0.3027$ , sombreados en la figura y cuya unión notamos  $D_1$ . (Es importante aquí observar que  $D_1$  está trivialmente contenido en  $D$  pero que la imagen inversa  $F^{-1}(\{1\})$  es en rigor más pequeña que  $D_1$ ; ésta corresponde en verdad a arcos de curva que podrían dibujarse en dicho dominio  $D_1$ ).



Ahora, haciendo  $t^2 = x^2 - 3x$ ;  $u^2 = y^2 - 3y$ , se tiene que  $x^2 + y^2 = t^2 + u^2 + 3(x + y)$ . Entonces el problema equivale a demostrar, simplificación evidente mediante, que  $t^2 + u^2 < 15 - (x + y)$  cuando  $t + u = 1$  siendo  $t$  y  $u$  no negativos.

Es obvio en tal caso que  $t^2 + u^2 \leq 1$ ; por otro lado, para todos los puntos  $(x, y)$  de  $F^{-1}(\{1\})$ , el valor de  $15 - (x + y)$  será siempre mayor o igual que  $15 - \text{Max}(x + y)$  con  $(x, y)$  ahora sobre toda la zona sombreada  $D_1$  de la figura, lo que está claramente dado por  $15 - (3 + \sqrt{13}) = 8.3945 > 1$ . Entonces se tiene  $1 < 15 - (x + y)$  si  $F(x, y) = 1$  de donde  $t^2 + u^2 < 15 - (x + y)$  lo que se quería demostrar.

**OBSERVACIÓN.-** (*Un mejoramiento del enunciado*) El método empleado en la solución, asegura que la cota 15 puede ser mejorada por cualquier positivo menor  $X$  tal que  $X - (3 + \sqrt{13}) > 1$ , es decir tal que  $X - 6.6055 > 1$ . El mejor entero obtenible, (*trabajando sobre el dominio  $D_1$  adoptado aquí; véase NOTA debajo*) resulta ser entonces el número 8.

**NOTA.-** Las acotaciones vistas no son lo bastante finas como podrían serlo y ciertamente existen números positivos menores que 8 y que podrían reemplazar al 15 del enunciado; averiguar, por ejemplo, si se puede poner o no el entero 7, sería un muy buen ejercicio para cualquier estudiante interesado en las olimpiadas matemáticas. Tal objetivo podría lograrse tratando de reducir el dominio  $D_1$  (la mejor reducción posible consiste en determinar exactamente  $F^{-1}(\{1\})$  y podría notarse para comenzar, que se pueden extraer vecindades adecuadas en varios de los 16 vértices de  $D_1$ , en los cuales se tenga  $F(x, y) \neq 1$  por lo que, siendo  $F$  continua, se tendrá "cerca" de dichos puntos  $F(x, y) \neq 1$ .

Problema 116 bis

Sean  $x$  e  $y$  números reales tales que

$$\sqrt{x^2 - 3x} + \sqrt{y^2 - 3y} = 1.$$

Demostrar que


$$x^2 + y^2 < 2(x + y) + 15.$$

Solución 1

La condición  $\sqrt{x^2 - 3x} + \sqrt{y^2 - 3y} = 1$  exige que cada radicado sea mayor o igual que 0 y menor o

igual que 1 lo que nos lleva a las acotaciones: 
$$\begin{cases} \frac{3 - \sqrt{13}}{2} \leq x \leq 0 \\ 3 \leq x \leq \frac{3 + \sqrt{13}}{2} \end{cases}, \begin{cases} \frac{3 - \sqrt{13}}{2} \leq y \leq 0 \\ 3 \leq y \leq \frac{3 + \sqrt{13}}{2} \end{cases}$$

Es decir los puntos cuyas coordenadas verifiquen la condición del enunciado quedan ubicados en el interior o la frontera de los cuatro cuadrados sombreados de la figura y estos cuadrados a su vez son interiores a la región  $x^2 + y^2 < 2(x + y) + 15$  que es claramente un círculo de centro  $(1, 1)$  y radio  $\sqrt{17}$  (de trazo grueso en la figura).



Solución 2.

Elevando al cuadrado la condición del enunciado:

$$\sqrt{x^2 - 3x} + \sqrt{y^2 - 3y} = 1 \Rightarrow x^2 - 3x + y^2 - 3y + 2\sqrt{(x^2 - 3x)(y^2 - 3y)} = 1$$

y siendo el radicado positivo, se deduce

$$x^2 + y^2 \leq 3(x + y) + 1$$

que es el interior de un círculo de centro  $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$  y radio  $\sqrt{\frac{11}{2}}$  (de trazo fino en la figura) claramente incluido en el interior del círculo del enunciado.

Problema 125.

Si  $a, b, c$  son estrictamente positivos, demostrar que

$$abc \leq \sqrt{\frac{abc(a^2b + b^2c + c^2a)}{3}} \leq \frac{1}{3}(a^2b + b^2c + c^2a)$$

*Solución:* Si tomamos las dos desigualdades por separado, después de elevarlas al cuadrado y simplificar llegaremos a la misma desigualdad:

$$abc \leq \frac{1}{3}(a^2b + b^2c + c^2a)$$

Ésta es la que vamos a probar. Dado que  $a, b, c$  son estrictamente positivos, nada nos impide considerar las tres cantidades

$$\frac{a}{c}, \frac{c}{b}, \frac{b}{a}.$$

Aplicando la desigualdad aritmético-geométrica a estas tres cantidades, obtenemos:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{b}{a}}{3} &\geq \sqrt[3]{\frac{a}{c} \cdot \frac{c}{b} \cdot \frac{b}{a}} \implies \\ \implies \frac{a^2b + b^2c + c^2a}{3abc} &\geq 1 \implies abc \leq \frac{1}{3}(a^2b + b^2c + c^2a) \end{aligned}$$

lo cual termina el problema.

## Problema 126

2 de octubre de 2006

**Propuesto por Laurentiu Modan, Bucarest, Rumania.** Sea  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  la sucesión definida por

$$\begin{cases} a_0 & = & -\frac{1}{2} \\ a_1 & = & 1 \\ a_{n+1} & = & 5a_n - 6a_{n-1} + 3 - 2n. \end{cases}$$

Calcular el límite siguiente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{3^n} + \frac{1}{2^{2n}} \right) a_n$$

**Solución de José Hernández Santiago, Oaxaca, México.** Al resolver la relación de recurrencia dada, haciendo uso de funciones generatrices por ejemplo, obtenemos que:

$$a_n = 2 \cdot 3^n - 3 \cdot 2^{n-1} - (n+1).$$

Así, al tenerse que:

$$\begin{aligned} \left( \frac{1}{3^n} + \frac{1}{2^{2n}} \right) a_n &= \frac{2 \cdot 3^n - 3 \cdot 2^{n-1} - (n+1)}{3^n} + \frac{2 \cdot 3^n - 3 \cdot 2^{n-1} - (n+1)}{2^{2n}} \\ &= \left( 2 - \left( \frac{2}{3} \right)^{n-1} - \frac{n+1}{3^n} \right) + \left( 2 \left( \frac{3}{4} \right)^n - \frac{3}{2^{n+1}} - \frac{n+1}{2^{2n}} \right), \end{aligned}$$

se concluye que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{3^n} + \frac{1}{2^{2n}} \right) a_n = 2.$$

\*

### Problema 127

Propuesto por Cristóbal Sánchez Rubio (Benicasim, España)  
Solución de Gabriel Alexander Reyes (San Salvador, El Salvador)

En un triángulo de lados  $a$ ,  $b$ ,  $c$  y área  $S$ , llamamos  $n$ -ágono medio,  $Q_n$ , a la media aritmética de las áreas de los tres  $n$ -ágonos regulares construidos sobre cada lado. Demostrar que

$$S \leq \frac{1}{n} \cdot Q_n \sqrt{3} \tan \frac{\pi}{n}$$

con igualdad si y sólo si el triángulo es equilátero.

Comenzamos encontrando el área del  $n$ -ágono regular construido sobre  $a$ . Sea  $O$  el centro del polígono y  $R$  su circunradio. Entonces el triángulo  $OBC$  es isósceles, de lados  $R$ ,  $R$  y  $a$ , y claramente su área es una  $n$ -ésima parte del área del polígono. Sea  $h$  la altura relativa al lado  $a$ ; entonces es fácil ver que  $h = R \cos(\pi/n)$ . Luego

$$(OBC) = \frac{a}{2} \cdot R \cos \frac{\pi}{n}$$

Y como por la ley de los senos  $a = 2R \sin(\pi/n)$  resulta que

$$(OBC) = \frac{a}{2} \cdot \frac{a}{2 \sin(\pi/n)} \cdot \cos \frac{\pi}{n} = \frac{a^2 \cos(\pi/n)}{4 \sin(\pi/n)} = \frac{a^2}{4 \tan(\pi/n)}$$

Por tanto el área del  $n$ -ágono regular construido sobre  $a$  viene dada por

$$\frac{a^2 n}{4 \tan(\pi/n)}$$

Con expresiones análogas para  $b$  y  $c$ . Así que

$$Q_n = \frac{1}{3} \left[ \frac{a^2 n}{4 \tan(\pi/n)} + \frac{b^2 n}{4 \tan(\pi/n)} + \frac{c^2 n}{4 \tan(\pi/n)} \right] = \frac{n(a^2 + b^2 + c^2)}{12 \tan(\pi/n)}$$

De donde el miembro derecho de la desigualdad en cuestión toma la forma

$$\frac{1}{n} \cdot Q_n \sqrt{3} \tan \frac{\pi}{n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(a^2 + b^2 + c^2)}{12 \tan(\pi/n)} \cdot \sqrt{3} \tan \frac{\pi}{n} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4\sqrt{3}}$$

En consecuencia nuestra desigualdad se reduce a probar que

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq 4\sqrt{3}S$$

Este es un resultado conocido (desigualdad de Weitzenböck); de hecho apareció como problema 2 en la IMO 1961.

Nuestra prueba se basa en la desigualdad de Mitrinović

$$r \leq \frac{s}{3\sqrt{3}} \leq \frac{R}{2}$$

Donde, como es habitual,  $R$  es el circunradio,  $r$  es el inradio y  $s$  es el semiperímetro del triángulo; y además las igualdades se tienen si y sólo si el triángulo es equilátero. Sólo haremos uso de la cota superior, de la siguiente manera:

$$\frac{s}{3\sqrt{3}} \leq \frac{R}{2} \Leftrightarrow \frac{2s}{3\sqrt{3}} = \frac{a+b+c}{3\sqrt{3}} \leq R = \frac{abc}{4S} \Leftrightarrow 4\sqrt{3}S \leq \frac{9abc}{a+b+c}$$

Así que basta con establecer que

$$\frac{9abc}{a+b+c} \leq a^2 + b^2 + c^2$$

Pero por la desigualdad media aritmética-media geométrica tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} &\geq \sqrt[3]{a^2 b^2 c^2} \\ \frac{a + b + c}{3} &\geq \sqrt[3]{abc} \end{aligned}$$

Y multiplicando estas dos desigualdades obtenemos

$$\frac{(a^2 + b^2 + c^2)(a + b + c)}{9} \geq \sqrt[3]{a^3 b^3 c^3} = abc$$

Y tenemos el resultado. Observemos que tenemos la igualdad si y sólo si  $a = b = c$ , esto es, si y sólo si el triángulo es equilátero. ■

**Nota.** En el libro *Problem-solving strategies* de Arthur Engel (cap. 7, pp. 170 y ss.), se hace un estudio muy completo de la desigualdad de Weitzenböck, presentándose once pruebas diferentes.

**Problema 128.**

Se considera un ángulo agudo  $\alpha > 0$  dividido en  $n$  partes iguales y se toma en un lado del ángulo un punto  $P_0$  cuya distancia al vértice  $O$  de sea igual a 1. A partir del punto  $P_0$  se determinan puntos  $P_1; P_2; \dots; P_n$  en los lados sucesivos de los  $n$  ángulos formados, tales que todos los segmentos  $P_{i-1}P_i, i=1, 2, \dots, n$  formen un ángulo agudo  $\beta$  con la recta  $OP_{i-1}$  y los segmentos  $OP_i$  sean sucesivamente crecientes.

Calcular el límite de la longitud del segmento final  $OP_n$ , cuando  $n$  tiende a infinito.


Solución.

Todos los triángulos  $OP_{i-1}P_i, (i=1, 2, \dots, n)$  son semejantes (tienen

iguales dos ángulos) con razón de semejanza  $r = \frac{OP_i}{OP_{i-1}}$ .

Hallaremos  $r$  por el teorema de los senos en  $OP_0P_1$ :

$$\frac{OP_0}{\text{sen}\beta} = \frac{OP_1}{\text{sen}\left(180^\circ - \beta - \frac{\alpha}{n}\right)} \Rightarrow r = \frac{OP_1}{OP_0} = \frac{\text{sen}\left(\beta + \frac{\alpha}{n}\right)}{\text{sen}\beta}$$



entonces tenemos que hallar:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} OP_n = \lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\text{sen}\left(\beta + \frac{\alpha}{n}\right)}{\text{sen}\beta} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{\alpha}{n} + \text{ctg} \beta \text{sen}\left(\frac{\alpha}{n}\right) \right)^n$$

el resto es un simple ejercicio de cálculo de límites del tipo  $1^\infty$ .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} OP_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{\alpha}{n} + \text{ctg} \beta \text{sen}\left(\frac{\alpha}{n}\right) \right)^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \cos \frac{\alpha}{n} + \text{ctg} \beta \text{sen}\left(\frac{\alpha}{n}\right) - 1 \right)} = e^{\alpha \text{ctg} \beta}$$

## Solución al Problema 129

Samuel Gómez Moreno,  
Departamento de Matemáticas, Universidad de Jaén.  
samuel@ujaen.es

### PROBLEMA 129

Calcular

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2nx}{\sin x} dx.$$

### SOLUCIÓN

Teniendo en cuenta que

$$\frac{1 \sin 2nx}{2 \sin x} = \cos x + \cos 3x + \dots + \cos(2n-1)x,$$

como puede probarse fácilmente usando inducción, nos queda

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2nx}{\sin x} dx &= 2 \sum_{k=1}^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2k-1)x dx = 2 \sum_{k=1}^n \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 2 \left( 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{2n-1} \right). \end{aligned}$$

Por tanto, usando que

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{2k-1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots = \arctan 1 = \frac{\pi}{4},$$

resulta finalmente

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2nx}{\sin x} dx = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{1}{2k-1} = 2 \arctan 1 = \frac{\pi}{2}.$$

### Problema 130

**Propuesto en la Cátedra de Análisis Matemático IV, Facultad de Ciencias de Madrid, junio de 1965**

Determinar una función holomorfa que verifica las siguientes condiciones:

- 1) está definida y es holomorfa en el primer cuadrante compacto, salvo en el punto  $1+i$ , donde tiene un polo de primer orden con residuo 1.
- 2) sobre el eje real toma valores reales, y sobre el imaginario, imaginarios puros.
- 3) es regular en el punto del infinito, y  $f(\infty)=0$ .

### **Solución de Daniel Lasiosa Medarde, Pamplona, España.**

Es conocido que el cociente de dos polinomios de  $z$  (donde  $z$  es la variable compleja) es holomorfo, estando definida en todo punto salvo en sus polos, es decir, en los ceros del denominador. Nos es dado que la función a buscar tiene un polo simple en  $z=1+i$  con residuo 1. Podemos pues buscar la función  $f(z)$  como suma de términos de la forma:

$$f(z) = \frac{1}{z-(1+i)} + \frac{A}{z-(1-i)} + \frac{B}{z-(-1+i)} + \frac{C}{z-(-1-i)},$$

Donde  $A$ ,  $B$  y  $C$  son constantes reales iguales a  $+1$  o  $-1$ . La razón de hacerlo de esta forma es la siguiente: los cuatro sumandos que conforman  $f(z)$  son regulares en el punto del infinito, tomando los cuatro el valor 0. Luego su suma también lo será y tomará también el valor 0, con lo que nos aseguramos el cumplimiento de la condición 3). Al mismo tiempo, los cuatro sumandos son holomorfos salvo en sus polos  $z=\pm 1\pm i$ , que son simples, y el polo en  $z=1+i$  tiene residuo 1, con lo que garantizamos la condición 1). Los tres últimos sumandos se introducen para crear en  $f(z)$  la simetría necesaria para conseguir que tome valores reales sobre la recta real e imaginarios sobre la recta imaginaria, a fin de cumplir la condición 2).

Para que en el eje real la función tome valores reales, debemos exigir que el conjugado de  $f(z)$  sea igual a sí mismo cuando  $z=x$  real, es decir, para todo real  $x$ ,

$$f(x) = \frac{1}{x-(1-i)} + \frac{A}{x-(1+i)} + \frac{B}{x-(-1-i)} + \frac{C}{x-(-1+i)}.$$

De aquí se deduce necesariamente que  $A=1$ ,  $B=C$ .

Al mismo tiempo, para que en el eje imaginario la función tome valores imaginarios, debemos exigir que el conjugado de  $f(z)$  sea su propio opuesto cuando  $z=iy$  imaginario, es decir, para todo real  $y$ ,

$$f(iy) = -\frac{1}{-iy-(1-i)} - \frac{A}{-iy-(1+i)} - \frac{B}{-iy-(-1-i)} - \frac{C}{-iy-(-1+i)}.$$

De aquí se deduce necesariamente que  $B=1$ ,  $C=A$ . Luego se tiene que podemos tomar

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-(1+i)} + \frac{1}{z-(1-i)} + \frac{1}{z-(-1+i)} + \frac{1}{z-(-1-i)} \\ &= \frac{2z-2}{z^2+2-2z} + \frac{2z+2}{z^2+2+2z} = \frac{4z^3}{z^4+4}. \end{aligned}$$

Obviamente, al ser cociente de dos polinomios, la función es holomorfa en todos sus puntos salvo en sus polos, que son simples, es regular en el infinito, tomando el valor 0, y por construcción tiene un polo en  $z=1+i$  con residuo 1, siendo holomorfa en el resto del primer cuadrante compacto, pues tiene exactamente un polo simple en el interior de cada uno de los cuatro cuadrantes. Además, tanto sobre la recta real como sobre la imaginaria, el denominador toma valores siempre reales y positivos, pues  $j^4=1$ , mientras que el numerador (y por lo tanto la función) toma valores reales sobre la recta real e imaginarios sobre la recta imaginaria.

## PROBLEMAS PROPUESTOS 131-135

**Problema 131.** Propuesto por José Luis Díaz Barrero, Barcelona, España.  
Calcular

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left\{ \prod_{k=1}^n \left( \frac{k^2 + \sqrt{k^4 + n^4}}{n^2} \right)^k \right\}^{1/n^2}.$$

**Problema 132.** Propuesto por José Luis Díaz Barrero, Barcelona, España.  
Sean  $x_1, x_2, \dots, x_n$  números reales dados. Para todo  $n \geq 1$ , demostrar que

$$\left( \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{T_k} \sin x_k \right) \left( \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{T_k} \cos x_k \right) \leq \frac{(n+1)(n+2)}{12},$$

donde  $T_k$  es el  $k$ -ésimo número triangular, definido por

$$T_k = \frac{k(k+1)}{2}, k \geq 1.$$

**Problema 133.** Propuesto por Juan Bosco Romero Márquez, Ávila, España.

Probar que si  $a \geq b > 0$ , y  $\lambda > 0$ , entonces se verifica

$$(\lambda + 1)b^2 - a^2 \leq \lambda ab \leq \lambda a^2.$$

¿Cuándo se alcanza la igualdad?

**Problema 134.** Propuesto por el editor.

Sean  $O, I, H$  el circuncentro, incentro y ortocentro, respectivamente, del triángulo  $ABC$ .


Conocidos los lados del triángulo  $OIH$ , determinar los lados del triángulo  $ABC$ .

**Problema 135.** Propuesto por el editor.

Demostrar que  $cx^2 - ax + b$  es un divisor común de  $ax^3 - bx^2 + c$  y  $bx^3 - cx + a$  si divide a uno de estos dos polinomios.

## DIVERTIMENTOS MATEMÁTICOS 27

### Algunas citas de *Mathematics in Fun and in Earnest*, de Nathan Altshiller Court



Nathan Altshiller Court fué un destacado geómetra de la Universidad de Oklahoma, autor de un célebre libro *Collage Geometry* (1ª edición 1925; 2ª, 1952), referencia obligada en muchas soluciones de problemas de CRUX MATHEMATICORUM, por ejemplo. En mi biblioteca hay un ejemplar de la primera edición, un regalo de mi querido amigo (lamentablemente desaparecido en 2000), Raimundo Reguera, en 1989. Posteriormente, y también como regalo de Kenneth Williams, antiguo manager de CRUX, conseguí un ejemplar de la segunda edición, de Barnes & Noble. Poco después del reciente ICM 2006 de Madrid he adquirido *Mathematics in Fun and in Earnest*, publicado en 1958, y es de este libro del que presentamos algunas citas.

- H. Lebesgue (1875-1941): *Las razones para declararse satisfecho por un razonamiento son de naturaleza psicológica, tanto en matemáticas como en cualquier otra ciencia.*
- Platón: *En su tiempo libre, Dios hace geometría.*
- Un comentario sobre Poincaré: *Este hombre maneja el análisis con tal destreza, que realmente se cree que todo es fácil.*
- *Los números naturales son como un autobús: todo el mundo cree que siempre hay sitio para uno más.*
- Thomas Hill (1818-1893): *Habitualmente se considera a las Matemáticas en las antípodas de la poesía. Pero las dos están realmente muy próximas, porque son obra de la imaginación.*
- Dan Pedoe: *El propósito final de los que trabajan en los fundamentos de la Geometría Algebraica es crear una estructura estéticamente placentera, sin errores lógicos, sobre la que se puedan exhibir los muchos ornamentos de la Geometría italiana.*
- N.A.Court: *El geómetra, como el poeta, sólo necesita para hacer su trabajo un montón de hojas de papel y una pluma, para ayudar a su imaginación a manifestarse, por medio de un quizá tosco y fragmentario esquema de las complejas creaciones con las que suele tratar.... El geómetra, como el poeta, es un soñador, un incorregible soñador. Se puede acusar a ambos de despistados, si se quiere, pero ninguno de ellos cambiaría sus sueños por nada de lo que el mundo puede ofrecer.... Sus sueños son los más preciosos momentos de su vida.*

Valladolid, octubre 2006.

Francisco Bellot Rosado

## Comentario de páginas web 27

La revista *L'Enseignement Mathématique*, en la red

[www.unige.ch/math/EnsMath/](http://www.unige.ch/math/EnsMath/)



Muy recientemente se ha completado la puesta en la red de la prestigiosa revista suiza *L'Enseignement Mathématique*, órgano oficial de la Comisión Internacional de Instrucción Matemática, y cuyo primer volumen se remonta a 1899. Los diferentes artículos se pueden descargar en pdf pulsando el logotipo de Adobe que aparece a la izquierda del título de cada uno de ellos. El resto de contenidos de la revista puede ser visualizado pulsando sobre ellos también, pero no están convertidos a ficheros pdf. La Universidad de Ginebra ha realizado de esta manera un trabajo encomiable, pues pone al alcance de todos los interesados, gratuitamente, los números de esta revista, con excepción de los de los últimos 6 años, que se irán incorporando cuando transcurra este tiempo desde su aparición en papel.

No es conveniente creer que *L'Enseignement Mathématique* es una revista de contenidos puramente didácticos, o de lo que hoy se conoce como Educación Matemática. Por supuesto contiene numerosos informes de las diferentes Comisiones de Estudio de la Enseñanza de las Matemáticas que ha propiciado la ICMI, desde la enseñanza Primaria a la Universitaria, en todo el mundo; pero sus artículos de fondo son de investigación, o mejor dicho, de divulgación de las teorías modernas que son objeto de investigación.

retrodigitized journals

Recomiendo la visita a este sitio web, en la seguridad de que el internauta encontrará artículos interesantes para descargar (por ejemplo, de Pólya, Halmos, Lichnerowicz o Freudenthal).

Valladolid, octubre 2006.

# Revista Escolar de la Olimpiada Iberoamericana de Matemática

<http://www.campus-oei.org/oim/revistaoidm/>

Edita:

